Autour de la convexité combinatoire

Xavier Goaoc

École des Mines de Nancy - LORIA

Université de Lorraine

EJCIM 2020

8-19 juin

Édition confinée

Commence par de la **convexité combinatoire**.

Propriétés des sous-ensembles convexes de $\mathbb{R}^d$.

d **finie** mais **arbitraire**.

Quelques outils **simples** pour faire de la géométrie
par des raisonnements combinatoires.

Commence par de la **convexité combinatoire**.

Propriétés des sous-ensembles convexes de $\mathbb{R}^d$.

d **finie** mais **arbitraire**.

Quelques outils **simples** pour faire de la géométrie par des raisonnements combinatoires.

Puis aller vers des **structures mathématiques** voisines.

Complexes simpliciaux, géométriques et abstraits.

Un peu d'**hypergraphes**.

Commence par de la **convexité combinatoire**.

Propriétés des sous-ensembles convexes de $\mathbb{R}^d$.

d **finie** mais **arbitraire**.

Quelques outils **simples** pour faire de la géométrie par des raisonnements combinatoires.

Puis aller vers des **structures mathématiques** voisines.

Complexes simpliciaux, géométriques et abstraits.

Un peu d'**hypergraphes**.

Liens nombreux vers info et maths.

Combinatoire $\rightarrow$ algorithmique.

Cadre convexe = "prototype".

Commence par de la **convexité combinatoire**.

Propriétés des sous-ensembles convexes de $\mathbb{R}^d$.

d **finie** mais **arbitraire**.

Quelques outils **simples** pour faire de la géométrie par des raisonnements combinatoires.

Puis aller vers des **structures mathématiques** voisines.

Complexes simpliciaux, géométriques et abstraits.

Un peu d'**hypergraphes**.

Liens nombreux vers info et maths.

Combinatoire $\rightarrow$ algorithmique.

Cadre convexe = "prototype".

Idées élégantes, technique élémentaire.

Preuves complètes dans le chapitre.

De nombreux problèmes ouverts.

1. Exemple introductif, en dimension 1

1. Exemple introductif, en dimension 1

Des intervalles de $\mathbb{R}$

1. Exemple introductif, en dimension 1

Des intervalles de $\mathbb{R}$

« Si beaucoup de paires d'intervalles se coupent
alors il existe un point qui est dans beaucoup d'intervalles. »

Proposition. Si, parmi n intervalles fermés de $\mathbb{R}$, $p \geq 1$ paires se coupent, alors il existe un point commun à $\geq \frac{p}{n} + 1$ des intervalles.

Proposition. Si, parmi n intervalles fermés de $\mathbb{R}$, $p \geq 1$ paires se coupent, alors il existe un point commun à $\geq \frac{p}{n} + 1$ des intervalles.

Intersection $\neq \emptyset \mapsto$ point maximal.

Proposition. Si, parmi n intervalles fermés de $\mathbb{R}$, $p \geq 1$ paires se coupent, alors il existe un point commun à $\geq \frac{p}{n} + 1$ des intervalles.

Intersection $\neq \emptyset \mapsto$ point maximal.

Proposition. Si, parmi n intervalles fermés de $\mathbb{R}$, $p \geq 1$ paires se coupent, alors il existe un point commun à $\geq \frac{p}{n} + 1$ des intervalles.

Intersection $\neq \emptyset \mapsto$ point maximal.

Proposition. Si, parmi n intervalles fermés de $\mathbb{R}$, $p \geq 1$ paires se coupent, alors il existe un point commun à $\geq \frac{p}{n} + 1$ des intervalles.

Intersection $\neq \emptyset \mapsto$ point maximal.

p intersections, $n - 1$ points maximaux.

max $\in$ extrémités droites d'intervalles.

Proposition. Si, parmi n intervalles fermés de $\mathbb{R}$, $p \geq 1$ paires se coupent, alors il existe un point commun à $\geq \frac{p}{n} + 1$ des intervalles.

Intersection $\neq \emptyset \mapsto$ point maximal.

p intersections, $n - 1$ points maximaux.

max $\in$ extrémités droites d'intervalles.

Une extrémité chargée $\geq \lceil \frac{p}{n-1} \rceil$ fois.

Proposition. Si, parmi n intervalles fermés de $\mathbb{R}$, $p \geq 1$ paires se coupent, alors il existe un point commun à $\geq \frac{p}{n} + 1$ des intervalles.

Intersection $\neq \emptyset \mapsto$ point maximal.

p intersections, $n - 1$ points maximaux.

max $\in$ extrémités droites d'intervalles.

Une extrémité chargée $\geq \lceil \frac{p}{n-1} \rceil$ fois.

Les graphes d'intersection des familles d'intervalles ont une structure particulière.

Densité positive $\Rightarrow$ clique de taille linéaire.

Proposition. Si, parmi n intervalles fermés de $\mathbb{R}$, $p \geq 1$ paires se coupent, alors il existe un point commun à $\geq \frac{p}{n} + 1$ des intervalles.

Intersection $\neq \emptyset \mapsto$ point maximal.

p intersections, $n - 1$ points maximaux.

max $\in$ extrémités droites d'intervalles.

Une extrémité chargée $\geq \lceil \frac{p}{n-1} \rceil$ fois.

Les graphes d'intersection des familles d'intervalles ont une structure particulière.

Densité positive $\Rightarrow$ clique de taille linéaire.

2. Un peu de vocabulaire géométrique

Espace $\mathbb{R}^d$, segment, convexe, enveloppe convexe, simplexe

Géométrie affine dans $\mathbb{R}^d$, point de vue "Cartésien".

Points $p = (p_1, p_2, \dots, p_d)$ et vecteurs $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_d)$.

Structure vectorielle : $\alpha p + \beta q \stackrel{\text{def}}{=} (\alpha p_1 + \beta q_1, \alpha p_2 + \beta q_2, \dots, \alpha p_d + \beta q_d)$.

Géométrie affine dans $\mathbb{R}^d$, point de vue "Cartésien".

Points $p = (p_1, p_2, \dots, p_d)$ et vecteurs $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_d)$.

Structure vectorielle : $\alpha p + \beta q \stackrel{\text{def}}{=} (\alpha p_1 + \beta q_1, \alpha p_2 + \beta q_2, \dots, \alpha p_d + \beta q_d)$.

Géométrie affine dans $\mathbb{R}^d$, point de vue "Cartésien".

Points $p = (p_1, p_2, \dots, p_d)$ et vecteurs $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_d)$.

Structure vectorielle : $\alpha p + \beta q \stackrel{\text{def}}{=} (\alpha p_1 + \beta q_1, \alpha p_2 + \beta q_2, \dots, \alpha p_d + \beta q_d)$.

Géométrie affine dans $\mathbb{R}^d$, point de vue "Cartésien".

Points $p = (p_1, p_2, \dots, p_d)$ et vecteurs $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_d)$.

Structure vectorielle : $\alpha p + \beta q \stackrel{\text{def}}{=} (\alpha p_1 + \beta q_1, \alpha p_2 + \beta q_2, \dots, \alpha p_d + \beta q_d)$.

Segment = ensemble des **combinaisons convexes** de deux points.

$\stackrel{\text{def}}{=} \text{combinaisons linéaires, poids } \geq 0 \text{ et } \sum \text{ poids} = 1.$

Géométrie affine dans $\mathbb{R}^d$, point de vue "Cartésien".

Points $p = (p_1, p_2, \dots, p_d)$ et vecteurs $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_d)$.

Structure vectorielle : $\alpha p + \beta q \stackrel{\text{def}}{=} (\alpha p_1 + \beta q_1, \alpha p_2 + \beta q_2, \dots, \alpha p_d + \beta q_d)$.

Segment = ensemble des **combinaisons convexes** de deux points.

$\stackrel{\text{def}}{=} \text{combinaisons linéaires, poids } \geq 0 \text{ et } \sum \text{ poids} = 1.$

$X \subseteq \mathbb{R}^d$ est **convexe**

$\Leftrightarrow X$ contient tout segment entre deux points de X .

Hyperplan $\stackrel{\text{def}}{=}$ ensemble de solutions d'une équation linéaire.
droite ($d = 2$), plan ($d = 3$), ...

Hyperplan $\stackrel{\text{def}}{=}$ ensemble de solutions d'une équation linéaire.
droite ($d = 2$), plan ($d = 3$), ...

demi-espace $\stackrel{\text{def}}{=}$ ensemble de solutions d'une inéquation linéaire.
< . > demi-espace **ouvert**.
 $\leq, \geq$ demi-espace **fermé**.

Hyperplan $\stackrel{\text{def}}{=}$ ensemble de solutions d'une équation linéaire.
droite ($d = 2$), plan ($d = 3$), ...

demi-espace $\stackrel{\text{def}}{=}$ ensemble de solutions d'une inéquation linéaire.
 $< . >$ demi-espace **ouvert**.
 $\leq, \geq$ demi-espace **fermé**.

Un hyperplan **borde** 2 demi-espaces ouverts et 2 demi-espaces fermés.

Hyperplan $\stackrel{\text{def}}{=}$ ensemble de solutions d'une équation linéaire.
droite ($d = 2$), plan ($d = 3$), ...

demi-espace $\stackrel{\text{def}}{=}$ ensemble de solutions d'une inéquation linéaire.
 $< . >$ demi-espace **ouvert**.
 $\leq, \geq$ demi-espace **fermé**.

Un hyperplan **borde** 2 demi-espaces ouverts et 2 demi-espaces fermés.

Un hyperplan h **sépare** deux ensembles A, B s'ils sont contenus dans des demi-espaces fermés distincts bordés par h .

Idem avec demi-espaces **ouverts** : séparation **stricte**.

Hyperplan $\stackrel{\text{def}}{=}$ ensemble de solutions d'une équation linéaire.
droite ($d = 2$), plan ($d = 3$), ...

demi-espace $\stackrel{\text{def}}{=}$ ensemble de solutions d'une inéquation linéaire.
 $< . >$ demi-espace **ouvert**.
 $\leq, \geq$ demi-espace **fermé**.

Un hyperplan **borde** 2 demi-espaces ouverts et 2 demi-espaces fermés.

Un hyperplan h **sépare** deux ensembles A, B s'ils sont contenus dans des demi-espaces fermés distincts bordés par h .

Idem avec demi-espaces **ouverts** : séparation **stricte**.

Hyperplan $\stackrel{\text{def}}{=}$ ensemble de solutions d'une équation linéaire.
droite ($d = 2$), plan ($d = 3$), ...

demi-espace $\stackrel{\text{def}}{=}$ ensemble de solutions d'une inéquation linéaire.
 $< . >$ demi-espace **ouvert**.
 $\leq, \geq$ demi-espace **fermé**.

Un hyperplan **borde** 2 demi-espaces ouverts et 2 demi-espaces fermés.

Un hyperplan h **sépare** deux ensembles A, B s'ils sont contenus dans des demi-espaces fermés distincts bordés par h .

Idem avec demi-espaces **ouverts** : séparation **stricte**.

Hyperplan $\stackrel{\text{def}}{=}$ ensemble de solutions d'une équation linéaire.
droite ($d = 2$), plan ($d = 3$), ...

demi-espace $\stackrel{\text{def}}{=}$ ensemble de solutions d'une inéquation linéaire.
 $< . >$ demi-espace **ouvert**.
 $\leq, \geq$ demi-espace **fermé**.

Un hyperplan **borde** 2 demi-espaces ouverts et 2 demi-espaces fermés.

Un hyperplan h **sépare** deux ensembles A, B s'ils sont contenus dans des demi-espaces fermés distincts bordés par h .

Idem avec demi-espaces **ouverts** : séparation **stricte**.

Séparation. Toute paire de convexes disjoints de $\mathbb{R}^d$ peut être séparée. Si l'un des convexes est **compact**, la séparation peut être **stricte**.

Hyperplan $\stackrel{\text{def}}{=}$ ensemble de solutions d'une équation linéaire.
droite ($d = 2$), plan ($d = 3$), ...

demi-espace $\stackrel{\text{def}}{=}$ ensemble de solutions d'une inéquation linéaire.
 $< . >$ demi-espace **ouvert**.
 $\leq, \geq$ demi-espace **fermé**.

Un hyperplan **borde** 2 demi-espaces ouverts et 2 demi-espaces fermés.

Un hyperplan h **sépare** deux ensembles A, B s'ils sont contenus dans des demi-espaces fermés distincts bordés par h .

Idem avec demi-espaces **ouverts** : séparation **stricte**.

Séparation. Toute paire de convexes disjoints de $\mathbb{R}^d$ peut être séparée.
Si l'un des convexes est **compact**, la séparation peut être **stricte**.

Si D est un demi-espace fermé et $P \subset \mathbb{R}^d$ est fini,
il existe un demi-espace **fermé** D' t. q. $P \cap D' = P \setminus D$.

Hyperplan $\stackrel{\text{def}}{=}$ ensemble de solutions d'une équation linéaire.
droite ($d = 2$), plan ($d = 3$), ...

demi-espace $\stackrel{\text{def}}{=}$ ensemble de solutions d'une inéquation linéaire.
 $< . >$ demi-espace **ouvert**.
 $\leq, \geq$ demi-espace **fermé**.

Un hyperplan **borde** 2 demi-espaces ouverts et 2 demi-espaces fermés.

Un hyperplan h **sépare** deux ensembles A, B s'ils sont contenus dans des demi-espaces fermés distincts bordés par h .

Idem avec demi-espaces **ouverts** : séparation **stricte**.

Séparation. Toute paire de convexes disjoints de $\mathbb{R}^d$ peut être séparée.
Si l'un des convexes est **compact**, la séparation peut être **stricte**.

Si D est un demi-espace fermé et $P \subset \mathbb{R}^d$ est fini,
il existe un demi-espace **fermé** D' t. q. $P \cap D' = P \setminus D$.

Opérateur d'enveloppe **convexe**.

$$\text{conv}(X) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i : n \in \mathbb{N}^*, p_i \in X, \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1 \right\}$$

Opérateur d'enveloppe **convexe**.

$$\text{conv}(X) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i : n \in \mathbb{N}^*, p_i \in X, \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1 \right\}$$

Opérateur d'enveloppe **convexe**.

$$\text{conv}(X) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i : n \in \mathbb{N}^*, p_i \in X, \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1 \right\}$$

Opérateur d'enveloppe **convexe**.

$$\text{conv}(X) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i : n \in \mathbb{N}^*, p_i \in X, \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1 \right\}$$

Opérateur d'enveloppe **convexe**.

$$\text{conv}(X) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i : n \in \mathbb{N}^*, p_i \in X, \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1 \right\}$$

Opérateur d'enveloppe **convexe**.

$$\text{conv}(X) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i : n \in \mathbb{N}^*, p_i \in X, \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1 \right\}$$

Opérateur d'enveloppe convexe.

$$\text{conv}(X) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i : n \in \mathbb{N}^*, p_i \in X, \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1 \right\}$$

Simplexe $\stackrel{\text{def}}{=}$ enveloppe convexe d'un ensemble affinement indépendant.

Aucun point n'appartient à l'enveloppe affine des autres.
 $\stackrel{\text{def}}{=} \text{comb. linéaires de } \sum \text{ poids} = 1.$

Opérateur d'enveloppe **convexe**.

$$\text{conv}(X) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i : n \in \mathbb{N}^*, p_i \in X, \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1 \right\}$$

Simplexe $\stackrel{\text{def}}{=}$ enveloppe convexe d'un ensemble affinement indépendant.

Aucun point n'appartient à l'**enveloppe affine** des autres.
 $\stackrel{\text{def}}{=} \text{comb. linéaires de } \sum \text{poids} = 1.$

Première question : quelles règles régissent le "calcul convexe" ?

Parties indépendantes ? Parties génératrices ?

$\simeq$ théorème de la base de l'algèbre linéaire ?

3. Les trois piliers

Trois énoncés élémentaires mais fondamentaux.

C. Carathéodory

J. Radon

E. Helly

Carathéodory : $p \in \text{conv}(X) \Rightarrow \exists$ un simplexe à sommets dans X contenant p .

$\text{conv}(X)$ = l'union des simplexes à sommets dans X .

$$\text{conv}(X) = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i : n \leq d + 1, p_i \in X, \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1 \right\}$$

Carathéodory : $p \in \text{conv}(X) \Rightarrow \exists$ un simplexe à sommets dans X contenant p .

$\text{conv}(X)$ = l'union des simplexes à sommets dans X .

$$\text{conv}(X) = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i : n \leq d + 1, p_i \in X, \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1 \right\}$$

Radon : Tout ensemble de $n \geq d + 2$ points de $\mathbb{R}^d$ contient deux sous-ensembles disjoints dont les enveloppes convexes se coupent.

Une forme de "relation de dépendance convexe".

Carathéodory : $p \in \text{conv}(X) \Rightarrow \exists$ un simplexe à sommets dans X contenant p .

$\text{conv}(X)$ = l'union des simplexes à sommets dans X .

$$\text{conv}(X) = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i : n \leq d + 1, p_i \in X, \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1 \right\}$$

Radon : Tout ensemble de $n \geq d + 2$ points de $\mathbb{R}^d$ contient deux sous-ensembles disjoints dont les enveloppes convexes se coupent.

Une forme de "relation de dépendance convexe".

Carathéodory : $p \in \text{conv}(X) \Rightarrow \exists$ un simplexe à sommets dans X contenant p .

$\text{conv}(X)$ = l'union des simplexes à sommets dans X .

$$\text{conv}(X) = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i : n \leq d + 1, p_i \in X, \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1 \right\}$$

Radon : Tout ensemble de $n \geq d + 2$ points de $\mathbb{R}^d$ contient deux sous-ensembles disjoints dont les enveloppes convexes se coupent.

Une forme de "relation de dépendance convexe".

Carathéodory : $p \in \text{conv}(X) \Rightarrow \exists$ un simplexe à sommets dans X contenant p .

$\text{conv}(X)$ = l'union des simplexes à sommets dans X .

$$\text{conv}(X) = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i : n \leq d + 1, p_i \in X, \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1 \right\}$$

Radon : Tout ensemble de $n \geq d + 2$ points de $\mathbb{R}^d$ contient deux sous-ensembles disjoints dont les enveloppes convexes se coupent.

Une forme de "relation de dépendance convexe".

Helly : Toute famille finie de convexes de $\mathbb{R}^d$ dont l'intersection est vide contient $\leq d + 1$ membres dont l'intersection est déjà vide.

Chaque $(d + 1)$ -uplet se coupe $\Rightarrow$ la famille entière a un point en commun.

Carathéodory : $p \in \text{conv}(X) \Rightarrow \exists$ un simplexe à sommets dans X contenant p .

$\text{conv}(X)$ = l'union des simplexes à sommets dans X .

$$\text{conv}(X) = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i : n \leq d + 1, p_i \in X, \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1 \right\}$$

Radon : Tout ensemble de $n \geq d + 2$ points de $\mathbb{R}^d$ contient deux sous-ensembles disjoints dont les enveloppes convexes se coupent.

Une forme de "relation de dépendance convexe".

Helly : Toute famille finie de convexes de $\mathbb{R}^d$ dont l'intersection est vide contient $\leq d + 1$ membres dont l'intersection est déjà vide.

Chaque $(d + 1)$ -uplet se coupe $\Rightarrow$ la famille entière a un point en commun.

Carathéodory : $p \in \text{conv}(X) \Rightarrow \exists$ un simplexe à sommets dans X contenant p .

$\text{conv}(X)$ = l'union des simplexes à sommets dans X .

$$\text{conv}(X) = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i : n \leq d + 1, p_i \in X, \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1 \right\}$$

Radon : Tout ensemble de $n \geq d + 2$ points de $\mathbb{R}^d$ contient deux sous-ensembles disjoints dont les enveloppes convexes se coupent.

Une forme de "relation de dépendance convexe".

Helly : Toute famille finie de convexes de $\mathbb{R}^d$ dont l'intersection est vide contient $\leq d + 1$ membres dont l'intersection est déjà vide.

Chaque $(d + 1)$ -uplet se coupe $\Rightarrow$ la famille entière a un point en commun.

Carathéodory : $p \in \text{conv}(X) \Rightarrow \exists$ un simplexe à sommets dans X contenant p .

$\text{conv}(X)$ = l'union des simplexes à sommets dans X .

$$\text{conv}(X) = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i : n \leq d + 1, p_i \in X, \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1 \right\}$$

Radon : Tout ensemble de $n \geq d + 2$ points de $\mathbb{R}^d$ contient deux sous-ensembles disjoints dont les enveloppes convexes se coupent.

Une forme de "relation de dépendance convexe".

Helly : Toute famille finie de convexes de $\mathbb{R}^d$ dont l'intersection est vide contient $\leq d + 1$ membres dont l'intersection est déjà vide.

Chaque $(d + 1)$ -uplet se coupe $\Rightarrow$ la famille entière a un point en commun.

Radon : Tout ensemble de $n \geq d + 2$ points de $\mathbb{R}^d$ contient deux sous-ensembles disjoints dont les enveloppes convexes se coupent.

$p_1, p_2, \dots, p_{d+2}$ des points de $\mathbb{R}^d$

Preuve

Radon : Tout ensemble de $n \geq d + 2$ points de $\mathbb{R}^d$ contient deux sous-ensembles disjoints dont les enveloppes convexes se coupent.

$p_1, p_2, \dots, p_{d+2}$ des points de $\mathbb{R}^d$

$$\begin{array}{c} \} \\ \} \\ \} \\ \downarrow \end{array} \quad \vec{p} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} p \\ \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

$\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_{d+2} \in \mathbb{R}^{d+1}$

Preuve

Radon : Tout ensemble de $n \geq d + 2$ points de $\mathbb{R}^d$ contient deux sous-ensembles disjoints dont les enveloppes convexes se coupent.

$p_1, p_2, \dots, p_{d+2}$ des points de $\mathbb{R}^d$

$$\downarrow \quad \vec{p} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} p \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_{d+2} \in \mathbb{R}^{d+1}$

$$\sum_{i=1}^{d+2} \alpha_i \vec{p}_i = 0.$$

Preuve

Radon : Tout ensemble de $n \geq d + 2$ points de $\mathbb{R}^d$ contient deux sous-ensembles disjoints dont les enveloppes convexes se coupent.

$p_1, p_2, \dots, p_{d+2}$ des points de $\mathbb{R}^d$

$$\Downarrow \quad \vec{p} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} p \\ \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

$\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_{d+2} \in \mathbb{R}^{d+1}$

$$\sum_{i=1}^{d+2} \alpha_i \vec{p}_i = 0.$$

$$\sum_{i:\alpha_i \geq 0} \alpha_i \vec{p}_i = \sum_{j:\alpha_j < 0} -\alpha_j \vec{p}_j$$

Preuve

Radon : Tout ensemble de $n \geq d + 2$ points de $\mathbb{R}^d$ contient deux sous-ensembles disjoints dont les enveloppes convexes se coupent.

$p_1, p_2, \dots, p_{d+2}$ des points de $\mathbb{R}^d$

$$\Downarrow \quad \vec{p} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} p \\ \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

$\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_{d+2} \in \mathbb{R}^{d+1}$

$$\sum_{i=1}^{d+2} \alpha_i \vec{p}_i = 0.$$

$$\sum_{i:\alpha_i \geq 0} \alpha_i \vec{p}_i = \sum_{j:\alpha_j < 0} -\alpha_j \vec{p}_j$$

$$\sum_{i:\alpha_i \geq 0} \alpha_i = \sum_{j:\alpha_j < 0} -\alpha_j.$$

Preuve

Radon : Tout ensemble de $n \geq d + 2$ points de $\mathbb{R}^d$ contient deux sous-ensembles disjoints dont les enveloppes convexes se coupent.

$p_1, p_2, \dots, p_{d+2}$ des points de $\mathbb{R}^d$

$$\Downarrow \quad \vec{p} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} p \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_{d+2} \in \mathbb{R}^{d+1}$

$$\sum_{i=1}^{d+2} \alpha_i \vec{p}_i = 0.$$

$$\sum_{i:\alpha_i \geq 0} \alpha_i \vec{p}_i = \sum_{j:\alpha_j < 0} -\alpha_j \vec{p}_j$$

$$\sum_{i:\alpha_i \geq 0} \alpha_i = \sum_{j:\alpha_j < 0} -\alpha_j.$$

$$\sum_{i:\alpha_i \geq 0} \alpha_i p_i = \sum_{j:\alpha_j < 0} -\alpha_j p_j$$

Preuve

Radon : Tout ensemble de $n \geq d + 2$ points de $\mathbb{R}^d$ contient deux sous-ensembles disjoints dont les enveloppes convexes se coupent.

$p_1, p_2, \dots, p_{d+2}$ des points de $\mathbb{R}^d$

$$\Downarrow \quad \vec{p} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} p \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_{d+2} \in \mathbb{R}^{d+1}$

$$\sum_{i=1}^{d+2} \alpha_i \vec{p}_i = 0.$$

$$\sum_{i:\alpha_i \geq 0} \alpha_i \vec{p}_i = \sum_{j:\alpha_j < 0} -\alpha_j \vec{p}_j$$

$$\sum_{i:\alpha_i \geq 0} \alpha_i = \sum_{j:\alpha_j < 0} -\alpha_j.$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{\stackrel{\text{def}}{=} \alpha}$$

$$\sum_{i:\alpha_i \geq 0} \alpha_i p_i = \sum_{j:\alpha_j < 0} -\alpha_j p_j$$

Preuve

Radon : Tout ensemble de $n \geq d + 2$ points de $\mathbb{R}^d$ contient deux sous-ensembles disjoints dont les enveloppes convexes se coupent.

$p_1, p_2, \dots, p_{d+2}$ des points de $\mathbb{R}^d$

$$\Downarrow \quad \vec{p} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} p \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_{d+2} \in \mathbb{R}^{d+1}$

$$\sum_{i=1}^{d+2} \alpha_i \vec{p}_i = 0.$$

$$\sum_{i:\alpha_i \geq 0} \alpha_i \vec{p}_i = \sum_{j:\alpha_j < 0} -\alpha_j \vec{p}_j$$

$$\sum_{i:\alpha_i \geq 0} \alpha_i = \sum_{j:\alpha_j < 0} -\alpha_j.$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{\stackrel{\text{def}}{=} \alpha}$$

$$\sum_{i:\alpha_i \geq 0} \alpha_i p_i = \sum_{j:\alpha_j < 0} -\alpha_j p_j$$

$$\sum_{i:\alpha_i \geq 0} \left(\frac{\alpha_i}{\alpha} \right) p_i = \sum_{j:\alpha_j < 0} \left(\frac{-\alpha_j}{\alpha} \right) p_j$$

Preuve

Radon : Tout ensemble de $n \geq d + 2$ points de $\mathbb{R}^d$ contient deux sous-ensembles disjoints dont les enveloppes convexes se coupent.

$p_1, p_2, \dots, p_{d+2}$ des points de $\mathbb{R}^d$

$$\left\{ \begin{array}{l} \downarrow \\ \downarrow \end{array} \right. \vec{p} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} p \\ \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

$\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_{d+2} \in \mathbb{R}^{d+1}$

$$\sum_{i=1}^{d+2} \alpha_i \vec{p}_i = 0.$$

$$\sum_{i:\alpha_i \geq 0} \alpha_i \vec{p}_i = \sum_{j:\alpha_j < 0} -\alpha_j \vec{p}_j$$

$$\sum_{i:\alpha_i \geq 0} \alpha_i = \sum_{j:\alpha_j < 0} -\alpha_j.$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{\stackrel{\text{def}}{=} \alpha}$$

$$\sum_{i:\alpha_i \geq 0} \alpha_i p_i = \sum_{j:\alpha_j < 0} -\alpha_j p_j$$

$$\sum_{i:\alpha_i \geq 0} \left(\frac{\alpha_i}{\alpha} \right) p_i = \sum_{j:\alpha_j < 0} \left(\frac{-\alpha_j}{\alpha} \right) p_j$$

Preuve

Les enveloppes convexes de $\{p_i : \alpha_i \geq 0\}$ et $\{p_j : \alpha_j < 0\}$ se coupent. □

Helly : Toute famille finie de convexes de $\mathbb{R}^d$ dont l'intersection est vide contient $\leq d + 1$ membres dont l'intersection est déjà vide.

La contraposée en dimension 2.
 n convexes dans $\mathbb{R}^2$, se coupant 3 à 3.

Preuve

Helly : Toute famille finie de convexes de $\mathbb{R}^d$ dont l'intersection est vide contient $\leq d + 1$ membres dont l'intersection est déjà vide.

La contraposée en dimension 2.
 n convexes dans $\mathbb{R}^2$, se coupant 3 à 3.

Prenons-en 4 : A_1, A_2, A_3 et A_4 .

Preuve

Helly : Toute famille finie de convexes de $\mathbb{R}^d$ dont l'intersection est vide contient $\leq d + 1$ membres dont l'intersection est déjà vide.

La contraposée en dimension 2.
 n convexes dans $\mathbb{R}^2$, se coupant 3 à 3.

Prenons-en 4 : A_1, A_2, A_3 et A_4 .

Prenons $p_i \in \bigcap_{j \neq i} A_j$.

Preuve

Helly : Toute famille finie de convexes de $\mathbb{R}^d$ dont l'intersection est vide contient $\leq d + 1$ membres dont l'intersection est déjà vide.

La contraposée en dimension 2.
 n convexes dans $\mathbb{R}^2$, se coupant 3 à 3.

Prenons-en 4 : A_1, A_2, A_3 et A_4 .

Prenons $p_i \in \bigcap_{j \neq i} A_j$.

Appliquons **Radon** à $\{p_1, p_2, p_3, p_4\}$.

Preuve

Helly : Toute famille finie de convexes de $\mathbb{R}^d$ dont l'intersection est vide contient $\leq d + 1$ membres dont l'intersection est déjà vide.

Preuve

La contraposée en dimension 2.
 n convexes dans $\mathbb{R}^2$, se coupant 3 à 3.

Prenons-en 4 : A_1, A_2, A_3 et A_4 .

Prenons $p_i \in \bigcap_{j \neq i} A_j$.

Appliquons **Radon** à $\{p_1, p_2, p_3, p_4\}$.

$\square \in A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4$.

Helly : Toute famille finie de convexes de $\mathbb{R}^d$ dont l'intersection est vide contient $\leq d + 1$ membres dont l'intersection est déjà vide.

Preuve

La contraposée en dimension 2.

n convexes dans $\mathbb{R}^2$, se coupant 3 à 3.

Prenons-en 4 : A_1, A_2, A_3 et A_4 .

Prenons $p_i \in \bigcap_{j \neq i} A_j$.

Appliquons **Radon** à $\{p_1, p_2, p_3, p_4\}$.

$\square \in A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4$.

Les n convexes se coupent 4 à 4. Prenons en 5...

Helly : Toute famille finie de convexes de $\mathbb{R}^d$ dont l'intersection est vide contient $\leq d + 1$ membres dont l'intersection est déjà vide.

Preuve

La contraposée en dimension 2.

n convexes dans $\mathbb{R}^2$, se coupant 3 à 3.

Prenons-en 4 : A_1, A_2, A_3 et A_4 .

Prenons $p_i \in \bigcap_{j \neq i} A_j$.

Appliquons **Radon** à $\{p_1, p_2, p_3, p_4\}$.

$\square \in A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4$.

Les n convexes se coupent 4 à 4. Prenons en 5... □

Carathéodory : $p \in \text{conv}(X) \Rightarrow \exists$ un simplexe à sommets dans X contenant p .

Radon : Tout ensemble de $n \geq d + 2$ points de $\mathbb{R}^d$ contient deux sous-ensembles disjoints dont les enveloppes convexes se coupent.

Helly : Toute famille finie de convexes de $\mathbb{R}^d$ dont l'intersection est vide contient $\leq d + 1$ membres dont l'intersection est déjà vide.

Carathéodory : $p \in \text{conv}(X) \Rightarrow \exists$ un simplexe à sommets dans X contenant p .

Radon : Tout ensemble de $n \geq d + 2$ points de $\mathbb{R}^d$ contient deux sous-ensembles disjoints dont les enveloppes convexes se coupent.

Helly : Toute famille finie de convexes de $\mathbb{R}^d$ dont l'intersection est vide contient $\leq d + 1$ membres dont l'intersection est déjà vide.

Quelques applications directes (en exercice) :

- L'enveloppe convexe d'un compact est compacte.

Carathéodory : $p \in \text{conv}(X) \Rightarrow \exists$ un simplexe à sommets dans X contenant p .

Radon : Tout ensemble de $n \geq d + 2$ points de $\mathbb{R}^d$ contient deux sous-ensembles disjoints dont les enveloppes convexes se coupent.

Helly : Toute famille finie de convexes de $\mathbb{R}^d$ dont l'intersection est vide contient $\leq d + 1$ membres dont l'intersection est déjà vide.

Quelques applications directes (en exercice) :

- L'enveloppe convexe d'un compact est compacte.
- Si $P \cup Q$ est affinement indépendant, alors $\text{conv}(P \cap Q) = \text{conv}(P) \cap \text{conv}(Q)$.

Carathéodory : $p \in \text{conv}(X) \Rightarrow \exists$ un simplexe à sommets dans X contenant p .

Radon : Tout ensemble de $n \geq d + 2$ points de $\mathbb{R}^d$ contient deux sous-ensembles disjoints dont les enveloppes convexes se coupent.

Helly : Toute famille finie de convexes de $\mathbb{R}^d$ dont l'intersection est vide contient $\leq d + 1$ membres dont l'intersection est déjà vide.

Quelques applications directes (en exercice) :

- L'enveloppe convexe d'un compact est compacte.
- Si $P \cup Q$ est affinement indépendant, alors $\text{conv}(P \cap Q) = \text{conv}(P) \cap \text{conv}(Q)$.
- **Radon** se généralise à r sous-ensembles disjoints d'enveloppes convexes sécantes.

Carathéodory : $p \in \text{conv}(X) \Rightarrow \exists$ un simplexe à sommets dans X contenant p .

Radon : Tout ensemble de $n \geq d + 2$ points de $\mathbb{R}^d$ contient deux sous-ensembles disjoints dont les enveloppes convexes se coupent.

Helly : Toute famille finie de convexes de $\mathbb{R}^d$ dont l'intersection est vide contient $\leq d + 1$ membres dont l'intersection est déjà vide.

Quelques applications directes (en exercice) :

- L'enveloppe convexe d'un compact est compacte.
- Si $P \cup Q$ est affinement indépendant, alors $\text{conv}(P \cap Q) = \text{conv}(P) \cap \text{conv}(Q)$.
- **Radon** se généralise à r sous-ensembles disjoints d'enveloppes convexes sécantes.
- R et B dans $\mathbb{R}^2$ sont linéairement séparables si dans tout quadruplet de $R \cup B$, les points de R et les points de B sont linéairement séparable.

Carathéodory : $p \in \text{conv}(X) \Rightarrow \exists$ un simplexe à sommets dans X contenant p .

Radon : Tout ensemble de $n \geq d + 2$ points de $\mathbb{R}^d$ contient deux sous-ensembles disjoints dont les enveloppes convexes se coupent.

Helly : Toute famille finie de convexes de $\mathbb{R}^d$ dont l'intersection est vide contient $\leq d + 1$ membres dont l'intersection est déjà vide.

Quelques applications directes (en exercice) :

- L'enveloppe convexe d'un compact est compacte.
- Si $P \cup Q$ est affinement indépendant, alors $\text{conv}(P \cap Q) = \text{conv}(P) \cap \text{conv}(Q)$.
- **Radon** se généralise à r sous-ensembles disjoints d'enveloppes convexes sécantes.
- R et B dans $\mathbb{R}^2$ sont linéairement séparables si dans tout quadruplet de $R \cup B$, les points de R et les points de B sont linéairement séparable.

Voyons une application moins directe...

4. Un peu de statistique spatiale

4. Un peu de statistique spatiale

$$P \subset \mathbb{R}^d$$

4. Un peu de statistique spatiale

$$P \subset \mathbb{R}^d$$

4. Un peu de statistique spatiale

Comment mesurer la « profondeur »
de $x \in \mathbb{R}^d$ relativement à P ?

$$P \subset \mathbb{R}^d$$

4. Un peu de statistique spatiale

$$P \subset \mathbb{R}^d$$

Comment mesurer la « profondeur »
de $x \in \mathbb{R}^d$ relativement à P ?

Qui de x ou x' est plus « intérieur » à P ?

P un sous-ensemble fini de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min(|P \cap (-\infty, x]|, |P \cap [x, \infty)|)$$

P un sous-ensemble fini de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min(|P \cap (-\infty, x]|, |P \cap [x, \infty)|)$$

$$\text{prof}(x_1, P) = 3$$

P un sous-ensemble fini de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min(|P \cap (-\infty, x]|, |P \cap [x, \infty)|)$$

$$\text{prof}(x_1, P) = 3 \qquad \text{prof}(x_2, P) = 5$$

P un sous-ensemble fini de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min(|P \cap (-\infty, x]|, |P \cap [x, \infty)|)$$

$$\text{prof}(x_1, P) = 3 \quad \text{prof}(x_2, P) = 5$$

P un sous-ensemble fini de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min(|P \cap (-\infty, x]|, |P \cap [x, \infty)|)$$

$$\text{prof}(x_1, P) = 3$$

$$\text{prof}(x_2, P) = 5$$

Profondeur de **demi-espaces**.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des **demi-espaces fermés** de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d : x \in h} |h \cap P|.$$

P un sous-ensemble fini de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min(|P \cap (-\infty, x]|, |P \cap [x, \infty)|)$$

$$\text{prof}(x_1, P) = 3 \quad \text{prof}(x_2, P) = 5$$

Profondeur de **demi-espaces**.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des **demi-espaces fermés** de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d : x \in h} |h \cap P|.$$

P un sous-ensemble fini de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min(|P \cap (-\infty, x]|, |P \cap [x, \infty)|)$$

$$\text{prof}(x_1, P) = 3$$

$$\text{prof}(x_2, P) = 5$$

Profondeur de **demi-espaces**.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des **demi-espaces fermés** de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d: x \in h} |h \cap P|.$$

P un sous-ensemble fini de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min(|P \cap (-\infty, x]|, |P \cap [x, \infty)|)$$

$$\text{prof}(x_1, P) = 3 \quad \text{prof}(x_2, P) = 5$$

Profondeur de **demi-espaces**.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des **demi-espaces fermés** de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d: x \in h} |h \cap P|.$$

P un sous-ensemble fini de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min(|P \cap (-\infty, x]|, |P \cap [x, \infty)|)$$

$$\text{prof}(x_1, P) = 3 \quad \text{prof}(x_2, P) = 5$$

Profondeur de demi-espaces.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des **demi-espaces fermés** de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d: x \in h} |h \cap P|.$$

Profondeur simpliciale.

$S(P)$ l'ensemble des **simplexes** à sommets dans P .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_S(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\sigma \in S: x \in \sigma\}|.$$

P un sous-ensemble fini de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min(|P \cap (-\infty, x]|, |P \cap [x, \infty)|)$$

$$\text{prof}(x_1, P) = 3 \quad \text{prof}(x_2, P) = 5$$

Profondeur de demi-espaces.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des **demi-espaces fermés** de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d: x \in h} |h \cap P|.$$

Profondeur simpliciale.

$S(P)$ l'ensemble des **simplexes** à sommets dans P .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_S(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\sigma \in S: x \in \sigma\}|.$$

P un sous-ensemble fini de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min(|P \cap (-\infty, x]|, |P \cap [x, \infty)|)$$

$$\text{prof}(x_1, P) = 3 \quad \text{prof}(x_2, P) = 5$$

Profondeur de demi-espaces.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des **demi-espaces fermés** de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d: x \in h} |h \cap P|.$$

Profondeur simpliciale.

$S(P)$ l'ensemble des **simplexes** à sommets dans P .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_S(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\sigma \in S: x \in \sigma\}|.$$

P un sous-ensemble fini de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min(|P \cap (-\infty, x]|, |P \cap [x, \infty)|)$$

$$\text{prof}(x_1, P) = 3 \qquad \text{prof}(x_2, P) = 5$$

Profondeur de demi-espaces.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des **demi-espaces fermés** de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d: x \in h} |h \cap P|.$$

Profondeur simpliciale.

$S(P)$ l'ensemble des **simplexes** à sommets dans P .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_S(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\sigma \in S: x \in \sigma\}|.$$

P un sous-ensemble fini de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min(|P \cap (-\infty, x]|, |P \cap [x, \infty)|)$$

$$\text{prof}(x_1, P) = 3 \qquad \text{prof}(x_2, P) = 5$$

Profondeur de **demi-espaces**.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des **demi-espaces fermés** de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d: x \in h} |h \cap P|.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \geq \frac{|P|}{d+1}$.

Profondeur **simpliciale**.

$S(P)$ l'ensemble des **simplexes** à sommets dans P .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_S(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\sigma \in S: x \in \sigma\}|.$$

P un sous-ensemble fini de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min(|P \cap (-\infty, x]|, |P \cap [x, \infty)|)$$

$$\text{prof}(x_1, P) = 3 \quad \text{prof}(x_2, P) = 5$$

Profondeur de demi-espaces.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des **demi-espaces fermés** de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d: x \in h} |h \cap P|.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \geq \frac{|P|}{d+1}$.

Profondeur simpliciale.

$S(P)$ l'ensemble des **simplexes** à sommets dans P .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_S(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\sigma \in S: x \in \sigma\}|.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_S(x, P) \geq c_d \frac{|P|}{d+1}$.

P un sous-ensemble fini de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min(|P \cap (-\infty, x]|, |P \cap [x, \infty)|)$$

$$\text{prof}(x_1, P) = 3 \quad \text{prof}(x_2, P) = 5$$

Profondeur de demi-espaces.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des **demi-espaces fermés** de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d: x \in h} |h \cap P|.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \geq \frac{|P|}{d+1}$.

Profondeur simpliciale.

$S(P)$ l'ensemble des **simplexes** à sommets dans P .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_S(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\sigma \in S: x \in \sigma\}|.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_S(x, P) \geq c_d \frac{|P|}{d+1}$.

ne dépend que de d
 $c_2 = 2/9$

Profondeur de demi-espaces.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des demi-espaces fermés de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d: x \in h} \#h \cap P.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \geq \frac{|P|}{d+1}$.

Profondeur de demi-espaces.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des demi-espaces fermés de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d: x \in h} \#h \cap P.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \geq \frac{|P|}{d+1}$.

Idée

Enlevons de $\mathbb{R}^d$ tous les points de profondeur $< t$. Il reste...

Profondeur de demi-espaces.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des demi-espaces fermés de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d: x \in h} \#h \cap P.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \geq \frac{|P|}{d+1}$.

Idée

Enlevons de $\mathbb{R}^d$ tous les points de profondeur $< t$. Il reste...

$$C(t) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{R}^d \setminus \left(\bigcup_{h \in \mathcal{H}_d: |h \cap P| < t} h \right)$$

Profondeur de demi-espaces.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des demi-espaces fermés de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d: x \in h} \#h \cap P.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \geq \frac{|P|}{d+1}$.

Idée

Enlevons de $\mathbb{R}^d$ tous les points de profondeur $< t$. Il reste...

$$C(t) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{R}^d \setminus \left(\bigcup_{h \in \mathcal{H}_d: |h \cap P| < t} h \right) = \bigcap_{h' \in \mathcal{H}_d: |h' \cap P| > |P| - t} h'$$

Profondeur de demi-espaces.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des demi-espaces fermés de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d: x \in h} \#h \cap P.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \geq \frac{|P|}{d+1}$.

Idée

Enlevons de $\mathbb{R}^d$ tous les points de profondeur $< t$. Il reste...

$$C(t) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{R}^d \setminus \left(\bigcup_{h \in \mathcal{H}_d: |h \cap P| < t} h \right) = \bigcap_{h' \in \mathcal{H}_d: |h' \cap P| > |P| - t} h'$$

intersection $\neq \emptyset$?

Profondeur de demi-espaces.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des demi-espaces fermés de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d: x \in h} \#h \cap P.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \geq \frac{|P|}{d+1}$.

Idée

Enlevons de $\mathbb{R}^d$ tous les points de profondeur $< t$. Il reste...

$$C(t) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{R}^d \setminus \left(\bigcup_{h \in \mathcal{H}_d: |h \cap P| < t} h \right) = \bigcap_{h' \in \mathcal{H}_d: |h' \cap P| > |P| - t} h'$$

intersection $\neq \emptyset$?
Helly?

Profondeur de demi-espaces.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des **demi-espaces fermés** de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d: x \in h} \#h \cap P.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \geq \frac{|P|}{d+1}$.

Idée

Enlevons de $\mathbb{R}^d$ tous les points de profondeur $< t$. Il reste...

$$C(t) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{R}^d \setminus \left(\bigcup_{h \in \mathcal{H}_d: |h \cap P| < t} h \right) = \bigcap_{h' \in \mathcal{H}_d: |h' \cap P| > |P| - t} h'$$

intersection $\neq \emptyset$?
Helly?

$Q_1, Q_2, \dots, Q_k$ les sous-ensembles de P de la forme $P \cap h$ avec $h \in \mathcal{H}_d$ et **manquant** $< \frac{|P|}{d+1}$ points de P .

Preuve

Profondeur de demi-espaces.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des **demi-espaces fermés** de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d: x \in h} \#h \cap P.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \geq \frac{|P|}{d+1}$.

Idée

Enlevons de $\mathbb{R}^d$ tous les points de profondeur $< t$. Il reste...

$$C(t) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{R}^d \setminus \left(\bigcup_{h \in \mathcal{H}_d: |h \cap P| < t} h \right) = \bigcap_{h' \in \mathcal{H}_d: |h' \cap P| > |P| - t} h'$$

intersection $\neq \emptyset$?
Helly?

$Q_1, Q_2, \dots, Q_k$ les sous-ensembles de P de la forme $P \cap h$ avec $h \in \mathcal{H}_d$ et **manquant** $< \frac{|P|}{d+1}$ points de P .

Pour tous $1 \leq i_1, i_2, \dots, i_{d+1} \leq k$, $\bigcap_{j=1}^{d+1} Q_{i_j} \neq \emptyset$.

← jeter $d+1$ fois $< \frac{1}{d+1}|P|$ ne suffit pas à vider P .

Preuve

Profondeur de demi-espaces.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des **demi-espaces fermés** de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d: x \in h} \#h \cap P.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \geq \frac{|P|}{d+1}$.

Idée

Enlevons de $\mathbb{R}^d$ tous les points de profondeur $< t$. Il reste...

$$C(t) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{R}^d \setminus \left(\bigcup_{h \in \mathcal{H}_d: |h \cap P| < t} h \right) = \bigcap_{h' \in \mathcal{H}_d: |h' \cap P| > |P| - t} h'$$

intersection $\neq \emptyset$?
Helly?

$Q_1, Q_2, \dots, Q_k$ les sous-ensembles de P de la forme $P \cap h$ avec $h \in \mathcal{H}_d$ et **manquant** $< \frac{|P|}{d+1}$ points de P .

Pour tous $1 \leq i_1, i_2, \dots, i_{d+1} \leq k$, $\bigcap_{j=1}^{d+1} \text{conv}(Q_{i_j}) \neq \emptyset$.

Preuve

Profondeur de demi-espaces.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des **demi-espaces fermés** de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d: x \in h} \#h \cap P.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \geq \frac{|P|}{d+1}$.

Idée

Enlevons de $\mathbb{R}^d$ tous les points de profondeur $< t$. Il reste...

$$C(t) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{R}^d \setminus \left(\bigcup_{h \in \mathcal{H}_d: |h \cap P| < t} h \right) = \bigcap_{h' \in \mathcal{H}_d: |h' \cap P| > |P| - t} h'$$

intersection $\neq \emptyset$?
Helly?

$Q_1, Q_2, \dots, Q_k$ les sous-ensembles de P de la forme $P \cap h$ avec $h \in \mathcal{H}_d$ et **manquant** $< \frac{|P|}{d+1}$ points de P .

Pour tous $1 \leq i_1, i_2, \dots, i_{d+1} \leq k$, $\bigcap_{j=1}^{d+1} \text{conv}(Q_{i_j}) \neq \emptyset$.

$\exists x \in \bigcap_{i=1}^k \text{conv}(Q_i)$ par **Helly**.

Preuve

Profondeur de demi-espaces.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des **demi-espaces fermés** de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d: x \in h} \#h \cap P.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \geq \frac{|P|}{d+1}$.

Idée

Enlevons de $\mathbb{R}^d$ tous les points de profondeur $< t$. Il reste...

$$C(t) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{R}^d \setminus \left(\bigcup_{h \in \mathcal{H}_d: |h \cap P| < t} h \right) = \bigcap_{h' \in \mathcal{H}_d: |h' \cap P| > |P| - t} h'$$

intersection $\neq \emptyset$?
Helly?

$Q_1, Q_2, \dots, Q_k$ les sous-ensembles de P de la forme $P \cap h$ avec $h \in \mathcal{H}_d$ et **manquant** $< \frac{|P|}{d+1}$ points de P .

Pour tous $1 \leq i_1, i_2, \dots, i_{d+1} \leq k$, $\bigcap_{j=1}^{d+1} \text{conv}(Q_{i_j}) \neq \emptyset$.

$\exists x \in \bigcap_{i=1}^k \text{conv}(Q_i)$ par **Helly**.

$$\forall h \in \mathcal{H}_d, \quad |h \cap P| < \frac{|P|}{d+1}$$

Preuve

Profondeur de demi-espaces.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des **demi-espaces fermés** de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d: x \in h} \#h \cap P.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \geq \frac{|P|}{d+1}$.

Idée

Enlevons de $\mathbb{R}^d$ tous les points de profondeur $< t$. Il reste...

$$C(t) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{R}^d \setminus \left(\bigcup_{h \in \mathcal{H}_d: |h \cap P| < t} h \right) = \bigcap_{h' \in \mathcal{H}_d: |h' \cap P| > |P| - t} h'$$

intersection $\neq \emptyset$?
Helly?

$Q_1, Q_2, \dots, Q_k$ les sous-ensembles de P de la forme $P \cap h$ avec $h \in \mathcal{H}_d$ et **manquant** $< \frac{|P|}{d+1}$ points de P .

Pour tous $1 \leq i_1, i_2, \dots, i_{d+1} \leq k$, $\bigcap_{j=1}^{d+1} \text{conv}(Q_{i_j}) \neq \emptyset$.

$\exists x \in \bigcap_{i=1}^k \text{conv}(Q_i)$ par **Helly**.

$\forall h \in \mathcal{H}_d, |h \cap P| < \frac{|P|}{d+1} \Rightarrow \mathbb{R}^d \setminus h$ contient un Q_i

Preuve

Profondeur de demi-espaces.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des **demi-espaces fermés** de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d: x \in h} \#h \cap P.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \geq \frac{|P|}{d+1}$.

Idée

Enlevons de $\mathbb{R}^d$ tous les points de profondeur $< t$. Il reste...

$$C(t) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{R}^d \setminus \left(\bigcup_{h \in \mathcal{H}_d: |h \cap P| < t} h \right) = \bigcap_{h' \in \mathcal{H}_d: |h' \cap P| > |P| - t} h'$$

intersection $\neq \emptyset$?
Helly?

$Q_1, Q_2, \dots, Q_k$ les sous-ensembles de P de la forme $P \cap h$ avec $h \in \mathcal{H}_d$ et **manquant** $< \frac{|P|}{d+1}$ points de P .

Pour tous $1 \leq i_1, i_2, \dots, i_{d+1} \leq k$, $\bigcap_{j=1}^{d+1} \text{conv}(Q_{i_j}) \neq \emptyset$.
 $\exists x \in \bigcap_{i=1}^k \text{conv}(Q_i)$ par **Helly**.

$\forall h \in \mathcal{H}_d, \quad |h \cap P| < \frac{|P|}{d+1} \Rightarrow \mathbb{R}^d \setminus h$ contient un Q_i
 $\Rightarrow \mathbb{R}^d \setminus h$ contient x

Preuve

Profondeur de demi-espaces.

$\mathcal{H}_d$ l'ensemble des **demi-espaces fermés** de $\mathbb{R}^d$.

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, \quad \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{h \in \mathcal{H}_d: x \in h} \#h \cap P.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \geq \frac{|P|}{d+1}$.

Idée

Enlevons de $\mathbb{R}^d$ tous les points de profondeur $< t$. Il reste...

$$C(t) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{R}^d \setminus \left(\bigcup_{h \in \mathcal{H}_d: |h \cap P| < t} h \right) = \bigcap_{h' \in \mathcal{H}_d: |h' \cap P| > |P| - t} h'$$

intersection $\neq \emptyset$?
Helly?

$Q_1, Q_2, \dots, Q_k$ les sous-ensembles de P de la forme $P \cap h$ avec $h \in \mathcal{H}_d$ et **manquant** $< \frac{|P|}{d+1}$ points de P .

Pour tous $1 \leq i_1, i_2, \dots, i_{d+1} \leq k$, $\bigcap_{j=1}^{d+1} \text{conv}(Q_{i_j}) \neq \emptyset$.
 $\exists x \in \bigcap_{i=1}^k \text{conv}(Q_i)$ par **Helly**.

$\forall h \in \mathcal{H}_d, |h \cap P| < \frac{|P|}{d+1} \Rightarrow \mathbb{R}^d \setminus h$ contient un Q_i
 $\Rightarrow \mathbb{R}^d \setminus h$ contient x $\square$

Preuve

Profondeur simpliciale.

$S(P)$ l'ensemble des **simplexes** à sommets dans P .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_S(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\sigma \in S : x \in \sigma\}|.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_S(x, P) \geq c_d \binom{|P|}{d+1}$.

Un point x dans $\text{conv}(P)$.

Preuve

Profondeur simpliciale.

$S(P)$ l'ensemble des **simplexes** à sommets dans P .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_S(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\sigma \in S : x \in \sigma\}|.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_S(x, P) \geq c_d \binom{|P|}{d+1}$.

Un point x dans $\text{conv}(P)$.

$\Rightarrow \exists \sigma_1 \in S(P)$ contenant x . $\leftarrow$ Carathéodory

Preuve

Profondeur simpliciale.

$S(P)$ l'ensemble des **simplexes** à sommets dans P .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_S(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\sigma \in S : x \in \sigma\}|.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_S(x, P) \geq c_d \binom{|P|}{d+1}$.

Un point x dans $\text{conv}(P)$.

$\Rightarrow \exists \sigma_1 \in S(P)$ contenant x . $\leftarrow$ Carathéodory

$$P_2 \stackrel{\text{def}}{=} P \setminus V(\sigma_1)$$

$V(\cdot) \stackrel{\text{def}}{=} \text{sommets de...}$

Preuve

Profondeur simpliciale.

$S(P)$ l'ensemble des **simplexes** à sommets dans P .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_S(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\sigma \in S : x \in \sigma\}|.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_S(x, P) \geq c_d \binom{|P|}{d+1}$.

Un point x dans $\text{conv}(P)$.

$\Rightarrow \exists \sigma_1 \in S(P)$ contenant x . $\leftarrow$ Carathéodory

$$P_2 \stackrel{\text{def}}{=} P \setminus V(\sigma_1)$$

$V(\cdot) \stackrel{\text{def}}{=} \text{sommets de...}$

On construit σ_2 ,

Preuve

Profondeur simpliciale.

$S(P)$ l'ensemble des **simplexes** à sommets dans P .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_S(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\sigma \in S : x \in \sigma\}|.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_S(x, P) \geq c_d \binom{|P|}{d+1}$.

Un point x dans $\text{conv}(P)$.

$\Rightarrow \exists \sigma_1 \in S(P)$ contenant x . ← Carathéodory

$$P_2 \stackrel{\text{def}}{=} P \setminus V(\sigma_1)$$

$V(\cdot) \stackrel{\text{def}}{=} \text{sommets de...}$

On construit $\sigma_2, P_3,$

Preuve

Profondeur simpliciale.

$S(P)$ l'ensemble des **simplexes** à sommets dans P .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_S(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\sigma \in S : x \in \sigma\}|.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_S(x, P) \geq c_d \binom{|P|}{d+1}$.

Un point x dans $\text{conv}(P)$.

$\Rightarrow \exists \sigma_1 \in S(P)$ contenant x . $\leftarrow$ Carathéodory

$$P_2 \stackrel{\text{def}}{=} P \setminus V(\sigma_1) \quad V(\cdot) \stackrel{\text{def}}{=} \text{sommets de...}$$

On construit $\sigma_2, P_3, \sigma_3,$

Preuve

Profondeur simpliciale.

$S(P)$ l'ensemble des **simplexes** à sommets dans P .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_S(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\sigma \in S : x \in \sigma\}|.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_S(x, P) \geq c_d \binom{|P|}{d+1}$.

Un point x dans $\text{conv}(P)$.

$\Rightarrow \exists \sigma_1 \in S(P)$ contenant x . ← Carathéodory

$$P_2 \stackrel{\text{def}}{=} P \setminus V(\sigma_1) \quad V(\cdot) \stackrel{\text{def}}{=} \text{sommets de...}$$

On construit $\sigma_2, P_3, \sigma_3, P_4,$

Preuve

Profondeur simpliciale.

$S(P)$ l'ensemble des **simplexes** à sommets dans P .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_S(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\sigma \in S : x \in \sigma\}|.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_S(x, P) \geq c_d \binom{|P|}{d+1}$.

Un point x dans $\text{conv}(P)$.

$\Rightarrow \exists \sigma_1 \in S(P)$ contenant x . ← Carathéodory

$$P_2 \stackrel{\text{def}}{=} P \setminus V(\sigma_1) \quad V(\cdot) \stackrel{\text{def}}{=} \text{sommets de...}$$

On construit $\sigma_2, P_3, \sigma_3, P_4, \dots$ et on s'arrête quand $x \notin \text{conv}(P_{k+1})$.

Preuve

Profondeur simpliciale.

$S(P)$ l'ensemble des **simplexes** à sommets dans P .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_S(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\sigma \in S : x \in \sigma\}|.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_S(x, P) \geq c_d \binom{|P|}{d+1}$.

Un point x dans $\text{conv}(P)$.

$\Rightarrow \exists \sigma_1 \in S(P)$ contenant x . ← Carathéodory

$$P_2 \stackrel{\text{def}}{=} P \setminus V(\sigma_1) \quad V(\cdot) \stackrel{\text{def}}{=} \text{sommets de...}$$

On construit $\sigma_2, P_3, \sigma_3, P_4, \dots$ et on s'arrête quand $x \notin \text{conv}(P_{k+1})$.

$k \geq ???$

Preuve

Profondeur simpliciale.

$S(P)$ l'ensemble des **simplexes** à sommets dans P .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_S(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\sigma \in S : x \in \sigma\}|.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_S(x, P) \geq c_d \binom{|P|}{d+1}$.

Un point x dans $\text{conv}(P)$.

$\Rightarrow \exists \sigma_1 \in S(P)$ contenant x . ← Carathéodory

$$P_2 \stackrel{\text{def}}{=} P \setminus V(\sigma_1) \quad V(\cdot) \stackrel{\text{def}}{=} \text{sommets de...}$$

On construit $\sigma_2, P_3, \sigma_3, P_4, \dots$ et on s'arrête quand $x \notin \text{conv}(P_{k+1})$.

$k \geq ???$

Hyperplan H séparant strictement x et $\text{conv}(P_{k+1})$.
 D demi-espace fermé contenant x bordé par H .

Preuve

Profondeur simpliciale.

$S(P)$ l'ensemble des **simplexes** à sommets dans P .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_S(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\sigma \in S : x \in \sigma\}|.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_S(x, P) \geq c_d \binom{|P|}{d+1}$.

Un point x dans $\text{conv}(P)$.

$\Rightarrow \exists \sigma_1 \in S(P)$ contenant x . ← Carathéodory

$$P_2 \stackrel{\text{def}}{=} P \setminus V(\sigma_1) \quad V(\cdot) \stackrel{\text{def}}{=} \text{sommets de...}$$

On construit $\sigma_2, P_3, \sigma_3, P_4, \dots$ et on s'arrête quand $x \notin \text{conv}(P_{k+1})$.

$k \geq ???$

Hyperplan H séparant strictement x et $\text{conv}(P_{k+1})$.
 D demi-espace fermé contenant x bordé par H .

$$\text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \leq |D \cap P|$$

↑
 $D \ni x$

Preuve

Profondeur simpliciale.

$S(P)$ l'ensemble des **simplexes** à sommets dans P .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_S(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\sigma \in S : x \in \sigma\}|.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_S(x, P) \geq c_d \binom{|P|}{d+1}$.

Un point x dans $\text{conv}(P)$.

$\Rightarrow \exists \sigma_1 \in S(P)$ contenant x . ← Carathéodory

$$P_2 \stackrel{\text{def}}{=} P \setminus V(\sigma_1) \quad V(\cdot) \stackrel{\text{def}}{=} \text{sommets de...}$$

On construit $\sigma_2, P_3, \sigma_3, P_4, \dots$ et on s'arrête quand $x \notin \text{conv}(P_{k+1})$.

$k \geq ???$

Hyperplan H séparant strictement x et $\text{conv}(P_{k+1})$.
 D demi-espace fermé contenant x bordé par H .

$$\text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \leq |D \cap P| \leq \sum_{i=1}^k |V(\sigma_i)|$$

$\uparrow$ $D \ni x$ $\uparrow$ $D \cap P_{k+1} = \emptyset$

Preuve

Profondeur simpliciale.

$S(P)$ l'ensemble des **simplexes** à sommets dans P .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_S(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\sigma \in S : x \in \sigma\}|.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_S(x, P) \geq c_d \binom{|P|}{d+1}$.

Un point x dans $\text{conv}(P)$.

$\Rightarrow \exists \sigma_1 \in S(P)$ contenant x . ← Carathéodory

$$P_2 \stackrel{\text{def}}{=} P \setminus V(\sigma_1) \quad V(\cdot) \stackrel{\text{def}}{=} \text{sommets de...}$$

On construit $\sigma_2, P_3, \sigma_3, P_4, \dots$ et on s'arrête quand $x \notin \text{conv}(P_{k+1})$.

$$k \geq \frac{1}{d+1} \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P)$$

Hyperplan H séparant strictement x et $\text{conv}(P_{k+1})$.
 D demi-espace fermé contenant x bordé par H .

$$\text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \leq |D \cap P| \leq \sum_{i=1}^k |V(\sigma_i)|$$

$\uparrow$ $D \ni x$ $\uparrow$ $D \cap P_{k+1} = \emptyset$

Preuve

Profondeur simpliciale.

$S(P)$ l'ensemble des **simplexes** à sommets dans P .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_S(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\sigma \in S : x \in \sigma\}|.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_S(x, P) \geq c_d \binom{|P|}{d+1}$.

Un point x dans $\text{conv}(P)$.

$\Rightarrow \exists \sigma_1 \in S(P)$ contenant x . ← Carathéodory

$$P_2 \stackrel{\text{def}}{=} P \setminus V(\sigma_1) \quad V(\cdot) \stackrel{\text{def}}{=} \text{sommets de...}$$

On construit $\sigma_2, P_3, \sigma_3, P_4, \dots$ et on s'arrête quand $x \notin \text{conv}(P_{k+1})$.

Preuve

Pour x maximisant la profondeur de demi-espace

$$k \geq \frac{1}{d+1} \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \geq \frac{|P|}{(d+1)^2}.$$

Hyperplan H séparant strictement x et $\text{conv}(P_{k+1})$.
 D demi-espace fermé contenant x bordé par H .

$$\text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \leq |D \cap P| \leq \sum_{i=1}^k |V(\sigma_i)|$$

$D \ni x$ $D \cap P_{k+1} = \emptyset$

Profondeur simpliciale.

$S(P)$ l'ensemble des **simplexes** à sommets dans P .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_S(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\sigma \in S : x \in \sigma\}|.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_S(x, P) \geq c_d \binom{|P|}{d+1}$.

Un point x dans $\text{conv}(P)$.

$\Rightarrow \exists \sigma_1 \in S(P)$ contenant x . ← Carathéodory

$$P_2 \stackrel{\text{def}}{=} P \setminus V(\sigma_1) \quad V(\cdot) \stackrel{\text{def}}{=} \text{sommets de...}$$

On construit $\sigma_2, P_3, \sigma_3, P_4, \dots$ et on s'arrête quand $x \notin \text{conv}(P_{k+1})$.

Et la, on multiplie les simplexes...

n simplexes d'ensembles de sommets **disjoints**
 $\rightarrow \binom{n}{d+1}$ simplexes d'ensembles de sommets **distincts**.

Pour x maximisant la profondeur de demi-espace

$$k \geq \frac{1}{d+1} \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \geq \frac{|P|}{(d+1)^2}.$$

Hyperplan H séparant strictement x et $\text{conv}(P_{k+1})$.
 D demi-espace fermé contenant x bordé par H .

$$\text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \leq |D \cap P| \leq \sum_{i=1}^k |V(\sigma_i)|$$

$\uparrow$ $D \ni x$ $\uparrow$ $D \cap P_{k+1} = \emptyset$

Preuve

Profondeur simpliciale.

$S(P)$ l'ensemble des **simplexes** à sommets dans P .

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{prof}_S(x, P) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\sigma \in S : x \in \sigma\}|.$$

Théorème. $\forall P, \exists x$ tel que $\text{prof}_S(x, P) \geq c_d \binom{|P|}{d+1}$.

Un point x dans $\text{conv}(P)$.

$\Rightarrow \exists \sigma_1 \in S(P)$ contenant x . ← Carathéodory

$$P_2 \stackrel{\text{def}}{=} P \setminus V(\sigma_1) \quad V(\cdot) \stackrel{\text{def}}{=} \text{sommets de...}$$

On construit $\sigma_2, P_3, \sigma_3, P_4, \dots$ et on s'arrête quand $x \notin \text{conv}(P_{k+1})$.

Et la, on multiplie les simplexes...

n simplexes d'ensembles de sommets **disjoints**
 $\rightarrow \binom{n}{d+1}$ simplexes d'ensembles de sommets **distincts**.

Pour x maximisant la profondeur de demi-espace

$$k \geq \frac{1}{d+1} \text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \geq \frac{|P|}{(d+1)^2}.$$

Hyperplan H séparant strictement x et $\text{conv}(P_{k+1})$.
 D demi-espace fermé contenant x bordé par H .

$$\text{prof}_{\mathcal{H}_d}(x, P) \leq |D \cap P| \leq \sum_{i=1}^k |V(\sigma_i)|$$

$\uparrow$ $D \ni x$ $\uparrow$ $D \cap P_{k+1} = \emptyset$

Preuve

multiplier les simplexes ???

Carathéodory coloré. Pour tous sous-ensembles finis $E_1, E_2, \dots, E_{d+1}$ de $\mathbb{R}^d$ et $x \in \bigcap_{i=1}^{d+1} \text{conv}(E_i)$, il existe $\{p_i \in E_i\}$ tels que $x \in \text{conv}(\{p_1, p_2, \dots, p_{d+1}\})$.

$$E_1 = \{ \circ, \circ, \circ \}$$

$$E_2 = \{ \circ, \circ, \circ \}$$

$$E_3 = \{ \circ, \circ, \circ \}$$

Carathéodory coloré. Pour tous sous-ensembles finis $E_1, E_2, \dots, E_{d+1}$ de $\mathbb{R}^d$ et $x \in \bigcap_{i=1}^{d+1} \text{conv}(E_i)$, il existe $\{p_i \in E_i\}$ tels que $x \in \text{conv}(\{p_1, p_2, \dots, p_{d+1}\})$.

$$E_1 = \{ \circ, \circ, \circ \}$$

$$E_2 = \{ \circ, \circ, \circ \}$$

$$E_3 = \{ \circ, \circ, \circ \}$$

Carathéodory coloré. Pour tous sous-ensembles finis $E_1, E_2, \dots, E_{d+1}$ de $\mathbb{R}^d$ et $x \in \bigcap_{i=1}^{d+1} \text{conv}(E_i)$, il existe $\{p_i \in E_i\}$ tels que $x \in \text{conv}(\{p_1, p_2, \dots, p_{d+1}\})$.

$$E_1 = \{ \circ, \circ, \circ \}$$

$$E_2 = \{ \circ, \circ, \circ \}$$

$$E_3 = \{ \circ, \circ, \circ \}$$

Simplexes $\sigma_1, \dots, \sigma_k$ contenant x et ne partageant pas de sommets.

$\forall 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{d+1} \leq k$, appliquer **C. col.** avec $E_j \stackrel{\text{def}}{=} V(\sigma_{i_j})$

$\rightsquigarrow$ nouveau simplexe contenant x .

Carathéodory coloré. Pour tous sous-ensembles finis $E_1, E_2, \dots, E_{d+1}$ de $\mathbb{R}^d$ et $x \in \bigcap_{i=1}^{d+1} \text{conv}(E_i)$, il existe $\{p_i \in E_i\}$ tels que $x \in \text{conv}(\{p_1, p_2, \dots, p_{d+1}\})$.

$$E_1 = \{ \text{red circle}, \text{red circle}, \text{red circle} \}$$

$$E_2 = \{ \text{blue circle}, \text{blue circle}, \text{blue circle} \}$$

$$E_3 = \{ \text{green circle}, \text{green circle}, \text{green circle} \}$$

Simplexes $\sigma_1, \dots, \sigma_k$ contenant x et ne partageant pas de sommets.

$\forall 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{d+1} \leq k$, appliquer **C. col.** avec $E_j \stackrel{\text{def}}{=} V(\sigma_{i_j})$

$\rightsquigarrow$ nouveau simplexe contenant x .

$$A = \text{les ensembles arc-en-ciel} \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ G \subset \bigcup_{i=1}^{d+1} E_i \quad : \quad \forall i, \quad |G \cap E_i| = 1 \right\}.$$

Carathéodory coloré. Pour tous sous-ensembles finis $E_1, E_2, \dots, E_{d+1}$ de $\mathbb{R}^d$ et $x \in \bigcap_{i=1}^{d+1} \text{conv}(E_i)$, il existe $\{p_i \in E_i\}$ tels que $x \in \text{conv}(\{p_1, p_2, \dots, p_{d+1}\})$.

$$E_1 = \{ \text{red circle}, \text{red circle}, \text{red circle} \}$$

$$E_2 = \{ \text{blue circle}, \text{blue circle}, \text{blue circle} \}$$

$$E_3 = \{ \text{green circle}, \text{green circle}, \text{green circle} \}$$

Simplexes $\sigma_1, \dots, \sigma_k$ contenant x et ne partageant pas de sommets.

$\forall 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{d+1} \leq k$, appliquer **C. col.** avec $E_j \stackrel{\text{def}}{=} V(\sigma_{i_j})$

$\rightsquigarrow$ nouveau simplexe contenant x .

$A =$ les ensembles **arc-en-ciel** $\stackrel{\text{def}}{=} \left\{ G \subset \bigcup_{i=1}^{d+1} E_i \quad : \quad \forall i, \quad |G \cap E_i| = 1 \right\}$.

$G_1 \stackrel{\text{def}}{=} \text{argmin}_{G \in A} \text{dist}_{\|\cdot\|_2}(\text{conv}(G), x)$.

Si $x \notin \text{conv}(G_1)$,

Carathéodory coloré. Pour tous sous-ensembles finis $E_1, E_2, \dots, E_{d+1}$ de $\mathbb{R}^d$ et $x \in \bigcap_{i=1}^{d+1} \text{conv}(E_i)$, il existe $\{p_i \in E_i\}$ tels que $x \in \text{conv}(\{p_1, p_2, \dots, p_{d+1}\})$.

$$E_1 = \{ \circ, \circ, \circ \}$$

$$E_2 = \{ \circ, \circ, \circ \}$$

$$E_3 = \{ \circ, \circ, \circ \}$$

Simplexes $\sigma_1, \dots, \sigma_k$ contenant x et ne partageant pas de sommets.

$\forall 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{d+1} \leq k$, appliquer **C. col.** avec $E_j \stackrel{\text{def}}{=} V(\sigma_{i_j})$

$\rightsquigarrow$ nouveau simplexe contenant x .

$A =$ les ensembles **arc-en-ciel** $\stackrel{\text{def}}{=} \left\{ G \subset \bigcup_{i=1}^{d+1} E_i \quad : \quad \forall i, \quad |G \cap E_i| = 1 \right\}$.

$G_1 \stackrel{\text{def}}{=} \text{argmin}_{G \in A} \text{dist}_{\|\cdot\|_2}(\text{conv}(G), x)$.

Si $x \notin \text{conv}(G_1)$, on peut améliorer G_1 ,

Carathéodory coloré. Pour tous sous-ensembles finis $E_1, E_2, \dots, E_{d+1}$ de $\mathbb{R}^d$ et $x \in \bigcap_{i=1}^{d+1} \text{conv}(E_i)$, il existe $\{p_i \in E_i\}$ tels que $x \in \text{conv}(\{p_1, p_2, \dots, p_{d+1}\})$.

$$E_1 = \{ \text{red circle}, \text{red circle}, \text{red circle} \}$$

$$E_2 = \{ \text{blue circle}, \text{blue circle}, \text{blue circle} \}$$

$$E_3 = \{ \text{green circle}, \text{green circle}, \text{green circle} \}$$

Simplexes $\sigma_1, \dots, \sigma_k$ contenant x et ne partageant pas de sommets.

$\forall 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{d+1} \leq k$, appliquer **C. col.** avec $E_j \stackrel{\text{def}}{=} V(\sigma_{i_j})$

$\rightsquigarrow$ nouveau simplexe contenant x .

$A =$ les ensembles **arc-en-ciel** $\stackrel{\text{def}}{=} \left\{ G \subset \bigcup_{i=1}^{d+1} E_i \quad : \quad \forall i, \quad |G \cap E_i| = 1 \right\}$.

$G_1 \stackrel{\text{def}}{=} \text{argmin}_{G \in A} \text{dist}_{\|\cdot\|_2}(\text{conv}(G), x)$.

Si $x \notin \text{conv}(G_1)$, on peut améliorer G_1 ,

Carathéodory coloré. Pour tous sous-ensembles finis $E_1, E_2, \dots, E_{d+1}$ de $\mathbb{R}^d$ et $x \in \bigcap_{i=1}^{d+1} \text{conv}(E_i)$, il existe $\{p_i \in E_i\}$ tels que $x \in \text{conv}(\{p_1, p_2, \dots, p_{d+1}\})$.

$$E_1 = \{ \text{red circle}, \text{red circle}, \text{red circle} \}$$

$$E_2 = \{ \text{blue circle}, \text{blue circle}, \text{blue circle} \}$$

$$E_3 = \{ \text{green circle}, \text{green circle}, \text{green circle} \}$$

Simplexes $\sigma_1, \dots, \sigma_k$ contenant x et ne partageant pas de sommets.

$\forall 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{d+1} \leq k$, appliquer **C. col.** avec $E_j \stackrel{\text{def}}{=} V(\sigma_{i_j})$

$\rightsquigarrow$ nouveau simplexe contenant x .

$A =$ les ensembles **arc-en-ciel** $\stackrel{\text{def}}{=} \left\{ G \subset \bigcup_{i=1}^{d+1} E_i \quad : \quad \forall i, \quad |G \cap E_i| = 1 \right\}$.

$G_1 \stackrel{\text{def}}{=} \text{argmin}_{G \in A} \text{dist}_{\|\cdot\|_2}(\text{conv}(G), x)$.

Si $x \notin \text{conv}(G_1)$, on peut améliorer G_1 , contradiction! $\square$

Un point de profondeur de demi-espace $\geq \frac{|P|}{d+1}$ est appelé **point central**.

Un point de profondeur de demi-espace $\geq \frac{|P|}{d+1}$ est appelé **point central**.

Nous venons de voir :

Théorème du point central. Tout ensemble de point admet un point central.

Lemme de sélection. Tout point central de P rencontre une fraction constante des simplexes à sommets dans P .

Un point de profondeur de demi-espace $\geq \frac{|P|}{d+1}$ est appelé **point central**.

Nous venons de voir :

Théorème du point central. Tout ensemble de point admet un point central.

Lemme de sélection. Tout point central de P rencontre une fraction constante des simplexes à sommets dans P .

Tout point central appartient à beaucoup de simplexes **indépendants** à sommets dans P .

Carathéodory coloré : beaucoup de simplexes **indépendants**
→ énormément de simplexes **distincts**.

Un point de profondeur de demi-espace $\geq \frac{|P|}{d+1}$ est appelé **point central**.

Nous venons de voir :

Théorème du point central. Tout ensemble de point admet un point central.

Lemme de sélection. Tout point central de P rencontre une fraction constante des simplexes à sommets dans P .

Tout point central appartient à beaucoup de simplexes **indépendants** à sommets dans P .

Carathéodory coloré : beaucoup de simplexes **indépendants**
→ énormément de simplexes **distincts**.

Généralisables aux **lois de probabilité** dans $\mathbb{R}^d$ (pour les Boréliens).

Ensembles finis $\simeq$ mesures discrètes, puis limite.

Théorème. $\forall \mu, \exists x$ tel que tout demi-espace contenant x est de μ -mesure $\geq \frac{1}{d+1}$.

Théorème. $\forall \mu, \exists x$ tel que $\mathbb{P}_{p_i \sim \mu} [x \in \text{conv}(\{p_1, p_2, \dots, p_{d+1}\})] \geq c_d$.

5. Un nouvel outil : Helly fractionnaire

[changement de transparents]

5. Un nouvel outil : Helly fractionnaire

5. Un nouvel outil : Helly fractionnaire

$\mathcal{F}$ une famille finie de convexes de $\mathbb{R}^d$.

5. Un nouvel outil : Helly fractionnaire

$\mathcal{F}$ une famille finie de convexes de $\mathbb{R}^d$.

Beaucoup de $(d + 1)$ -uplets de $\mathcal{F}$ ont une intersection non vide

5. Un nouvel outil : Helly fractionnaire

$\mathcal{F}$ une famille finie de convexes de $\mathbb{R}^d$.

Beaucoup de $(d + 1)$ -uplets de $\mathcal{F}$ ont une intersection non vide

⇓?

une **grande sous-famille** de $\mathcal{F}$ est d'intersection non vide.

$$d = 1$$

On a vu que si, parmi n intervalles fermés de $\mathbb{R}$, $p \geq 1$ paires se coupent, alors il existe un point commun à $\geq \frac{p}{n} + 1$ des intervalles.

$$d = 1$$

On a vu que si, parmi n intervalles fermés de $\mathbb{R}$, $p \geq 1$ paires se coupent, alors il existe un point commun à $\geq \frac{p}{n} + 1$ des intervalles.

$$p \geq \alpha \binom{n}{2} \Rightarrow \frac{p}{n} + 1 \geq \frac{\alpha}{2} n.$$

$$d = 1 \quad \text{---} \overline{\text{---}} \overline{\text{---}} \overline{\text{---}} \overline{\text{---}} \overline{\text{---}}$$

On a vu que si, parmi n intervalles fermés de $\mathbb{R}$, une fraction $\alpha > 0$ des paires se coupent alors il existe un point commun à une fraction $\alpha/2 > 0$ des intervalles.

$$p \geq \alpha \binom{n}{2} \Rightarrow \frac{p}{n} + 1 \geq \frac{\alpha}{2} n.$$

$$d = 1 \quad \text{---} \overline{\text{---}} \overline{\text{---}} \overline{\text{---}} \overline{\text{---}} \overline{\text{---}}$$

On a vu que si, parmi n intervalles fermés de $\mathbb{R}$, une fraction $\alpha > 0$ des paires se coupent alors il existe un point commun à une fraction $\alpha/2 > 0$ des intervalles.

$$p \geq \alpha \binom{n}{2} \Rightarrow \frac{p}{n} + 1 \geq \frac{\alpha}{2} n.$$

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, $\exists \beta > 0$ tel que pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de convexes de $\mathbb{R}^d$, si **une fraction α de $\binom{\mathcal{F}}{d+1}$** sont d'intersection non vide, alors **une fraction β de $\mathcal{F}$** a un point en commun.

$\binom{\mathcal{F}}{d+1} \stackrel{\text{def}}{=} \text{l'ensemble des } (d+1)\text{-uplets de } \mathcal{F}.$

$$d = 1 \quad \text{---} \overbrace{\text{---} \text{---} \text{---}}^{\text{---}}$$

On a vu que si, parmi n intervalles fermés de $\mathbb{R}$, une fraction $\alpha > 0$ des paires se coupent alors il existe un point commun à une fraction $\alpha/2 > 0$ des intervalles.

$$p \geq \alpha \binom{n}{2} \Rightarrow \frac{p}{n} + 1 \geq \frac{\alpha}{2} n.$$

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, $\exists \beta > 0$ tel que pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de convexes de $\mathbb{R}^d$, si **une fraction α de $\binom{\mathcal{F}}{d+1}$** sont d'intersection non vide, alors **une fraction β de $\mathcal{F}$** a un point en commun.

$\binom{\mathcal{F}}{d+1} \stackrel{\text{def}}{=} \text{l'ensemble des } (d+1)\text{-uplets de } \mathcal{F}.$

Version faible : $\beta = \frac{\alpha}{d+1}$, preuve similaire au cas $d = 1$.

Intersection $\neq \emptyset \mapsto$ point maximal.

Principe des tiroirs.

On munit $\mathbb{R}^d$ de l'ordre lexicographique, noté $\prec$.

$$(x_1, x_2, \dots, x_d) \prec (y_1, y_2, \dots, y_d) \Leftrightarrow x_1 < y_1$$

ou $x_1 = y_1$ et $x_2 < y_2$

...

ou $(x_1, x_2, \dots, x_{d-1}) = (y_1, y_2, \dots, y_{d-1})$ et $x_d < y_d$

On munit $\mathbb{R}^d$ de l'ordre lexicographique, noté $\prec$.

$$(x_1, x_2, \dots, x_d) \prec (y_1, y_2, \dots, y_d) \Leftrightarrow x_1 < y_1$$

ou $x_1 = y_1$ et $x_2 < y_2$

...

ou $(x_1, x_2, \dots, x_{d-1}) = (y_1, y_2, \dots, y_{d-1})$ et $x_d < y_d$

On munit $\mathbb{R}^d$ de l'ordre lexicographique, noté $\prec$.

$$(x_1, x_2, \dots, x_d) \prec (y_1, y_2, \dots, y_d) \Leftrightarrow x_1 < y_1$$

$$\text{ou } x_1 = y_1 \text{ et } x_2 < y_2$$

...

$$\text{ou } (x_1, x_2, \dots, x_{d-1}) = (y_1, y_2, \dots, y_{d-1}) \text{ et } x_d < y_d$$

Tout compact $X \subset \mathbb{R}^d$ a un point maximum pour $\prec$, noté $\max_{\prec} X$.

On munit $\mathbb{R}^d$ de l'ordre lexicographique, noté $\prec$.

$$(x_1, x_2, \dots, x_d) \prec (y_1, y_2, \dots, y_d) \Leftrightarrow x_1 < y_1$$

$$\text{ou } x_1 = y_1 \text{ et } x_2 < y_2$$

...

$$\text{ou } (x_1, x_2, \dots, x_{d-1}) = (y_1, y_2, \dots, y_{d-1}) \text{ et } x_d < y_d$$

Tout compact $X \subset \mathbb{R}^d$ a un point maximum pour $\prec$, noté $\max_{\prec} X$.

Lemme. Pour toute famille finie $\mathcal{A}$ d'intervalles fermés de $\mathbb{R}$, il existe un intervalle $B \in \mathcal{A}$ tel que $\max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) = \max_{\prec} B$.

$$\cap \mathcal{A} \stackrel{\text{def}}{=} \cap_{X \in \mathcal{A}} X.$$

On munit $\mathbb{R}^d$ de l'ordre lexicographique, noté $\prec$.

$$(x_1, x_2, \dots, x_d) \prec (y_1, y_2, \dots, y_d) \Leftrightarrow x_1 < y_1$$

$$\text{ou } x_1 = y_1 \text{ et } x_2 < y_2$$

...

$$\text{ou } (x_1, x_2, \dots, x_{d-1}) = (y_1, y_2, \dots, y_{d-1}) \text{ et } x_d < y_d$$

Tout compact $X \subset \mathbb{R}^d$ a un point maximum pour $\prec$, noté $\max_{\prec} X$.

Lemme. Pour toute famille finie $\mathcal{A}$ de compacts convexes de $\mathbb{R}^d$, il existe $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ tel que $|\mathcal{B}| \leq d$ et $\max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) = \max_{\prec} (\cap \mathcal{B})$.

$$\cap \mathcal{A} \stackrel{\text{def}}{=} \cap_{X \in \mathcal{A}} X.$$

On munit $\mathbb{R}^d$ de l'ordre lexicographique, noté $\prec$.

$$(x_1, x_2, \dots, x_d) \prec (y_1, y_2, \dots, y_d) \Leftrightarrow x_1 < y_1$$

ou $x_1 = y_1$ et $x_2 < y_2$

...

ou $(x_1, x_2, \dots, x_{d-1}) = (y_1, y_2, \dots, y_{d-1})$ et $x_d < y_d$

Tout compact $X \subset \mathbb{R}^d$ a un point maximum pour $\prec$, noté $\max_{\prec} X$.

Lemme. Pour toute famille finie $\mathcal{A}$ de compacts convexes de $\mathbb{R}^d$, il existe $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ tel que $|\mathcal{B}| \leq d$ et $\max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) = \max_{\prec} (\cap \mathcal{B})$.

$$\cap \mathcal{A} \stackrel{\text{def}}{=} \cap_{X \in \mathcal{A}} X.$$

On munit $\mathbb{R}^d$ de l'ordre lexicographique, noté $\prec$.

$$(x_1, x_2, \dots, x_d) \prec (y_1, y_2, \dots, y_d) \Leftrightarrow x_1 < y_1$$

$$\text{ou } x_1 = y_1 \text{ et } x_2 < y_2$$

...

$$\text{ou } (x_1, x_2, \dots, x_{d-1}) = (y_1, y_2, \dots, y_{d-1}) \text{ et } x_d < y_d$$

Tout compact $X \subset \mathbb{R}^d$ a un point maximum pour $\prec$, noté $\max_{\prec} X$.

Lemme. Pour toute famille finie $\mathcal{A}$ de compacts convexes de $\mathbb{R}^d$, il existe $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ tel que $|\mathcal{B}| \leq d$ et $\max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) = \max_{\prec} (\cap \mathcal{B})$.

$$\cap \mathcal{A} \stackrel{\text{def}}{=} \cap_{X \in \mathcal{A}} X.$$

On munit $\mathbb{R}^d$ de l'ordre lexicographique, noté $\prec$.

$$(x_1, x_2, \dots, x_d) \prec (y_1, y_2, \dots, y_d) \Leftrightarrow x_1 < y_1$$

ou $x_1 = y_1$ et $x_2 < y_2$

...

ou $(x_1, x_2, \dots, x_{d-1}) = (y_1, y_2, \dots, y_{d-1})$ et $x_d < y_d$

Tout compact $X \subset \mathbb{R}^d$ a un point maximum pour $\prec$, noté $\max_{\prec} X$.

Lemme. Pour toute famille finie $\mathcal{A}$ de compacts convexes de $\mathbb{R}^d$, il existe $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ tel que $|\mathcal{B}| \leq d$ et $\max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) = \max_{\prec} (\cap \mathcal{B})$.

$$\cap \mathcal{A} \stackrel{\text{def}}{=} \cap_{X \in \mathcal{A}} X.$$

On munit $\mathbb{R}^d$ de l'ordre lexicographique, noté $\prec$.

$$(x_1, x_2, \dots, x_d) \prec (y_1, y_2, \dots, y_d) \Leftrightarrow x_1 < y_1$$

ou $x_1 = y_1$ et $x_2 < y_2$

...

ou $(x_1, x_2, \dots, x_{d-1}) = (y_1, y_2, \dots, y_{d-1})$ et $x_d < y_d$

Tout compact $X \subset \mathbb{R}^d$ a un point maximum pour $\prec$, noté $\max_{\prec} X$.

Lemme. Pour toute famille finie $\mathcal{A}$ de compacts convexes de $\mathbb{R}^d$, il existe $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ tel que $|\mathcal{B}| \leq d$ et $\max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) = \max_{\prec} (\cap \mathcal{B})$.

$$\cap \mathcal{A} \stackrel{\text{def}}{=} \cap_{X \in \mathcal{A}} X.$$

$$p^* \stackrel{\text{def}}{=} \max_{\prec} (\cap \mathcal{A})$$

Preuve

On munit $\mathbb{R}^d$ de l'ordre lexicographique, noté $\prec$.

$$(x_1, x_2, \dots, x_d) \prec (y_1, y_2, \dots, y_d) \Leftrightarrow x_1 < y_1$$

$$\text{ou } x_1 = y_1 \text{ et } x_2 < y_2$$

...

$$\text{ou } (x_1, x_2, \dots, x_{d-1}) = (y_1, y_2, \dots, y_{d-1}) \text{ et } x_d < y_d$$

Tout compact $X \subset \mathbb{R}^d$ a un point maximum pour $\prec$, noté $\max_{\prec} X$.

Lemme. Pour toute famille finie $\mathcal{A}$ de compacts convexes de $\mathbb{R}^d$, il existe $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ tel que $|\mathcal{B}| \leq d$ et $\max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) = \max_{\prec} (\cap \mathcal{B})$.

$$\cap \mathcal{A} \stackrel{\text{def}}{=} \cap_{X \in \mathcal{A}} X.$$

$$p^* \stackrel{\text{def}}{=} \max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) \text{ et } h \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R}^d : p^* \prec x\},$$

Preuve

On munit $\mathbb{R}^d$ de l'ordre lexicographique, noté $\prec$.

$$(x_1, x_2, \dots, x_d) \prec (y_1, y_2, \dots, y_d) \Leftrightarrow x_1 < y_1$$

ou $x_1 = y_1$ et $x_2 < y_2$

...

ou $(x_1, x_2, \dots, x_{d-1}) = (y_1, y_2, \dots, y_{d-1})$ et $x_d < y_d$

Tout compact $X \subset \mathbb{R}^d$ a un point maximum pour $\prec$, noté $\max_{\prec} X$.

Lemme. Pour toute famille finie $\mathcal{A}$ de compacts convexes de $\mathbb{R}^d$, il existe $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ tel que $|\mathcal{B}| \leq d$ et $\max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) = \max_{\prec} (\cap \mathcal{B})$.

$$\cap \mathcal{A} \stackrel{\text{def}}{=} \cap_{X \in \mathcal{A}} X.$$

$$p^* \stackrel{\text{def}}{=} \max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) \text{ et } h \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R}^d : p^* \prec x\},$$

Preuve

On munit $\mathbb{R}^d$ de l'ordre lexicographique, noté $\prec$.

$$(x_1, x_2, \dots, x_d) \prec (y_1, y_2, \dots, y_d) \Leftrightarrow x_1 < y_1$$

ou $x_1 = y_1$ et $x_2 < y_2$

...

ou $(x_1, x_2, \dots, x_{d-1}) = (y_1, y_2, \dots, y_{d-1})$ et $x_d < y_d$

Tout compact $X \subset \mathbb{R}^d$ a un point maximum pour $\prec$, noté $\max_{\prec} X$.

Lemme. Pour toute famille finie $\mathcal{A}$ de compacts convexes de $\mathbb{R}^d$, il existe $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ tel que $|\mathcal{B}| \leq d$ et $\max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) = \max_{\prec} (\cap \mathcal{B})$.

$$\cap \mathcal{A} \stackrel{\text{def}}{=} \cap_{X \in \mathcal{A}} X.$$

$$p^* \stackrel{\text{def}}{=} \max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) \text{ et } h \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R}^d : p^* \prec x\},$$

$$\forall \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}, \quad \max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) \in \cap \mathcal{B}.$$

but : trouver $\mathcal{B}$ tel que $\cap \mathcal{B}$ évite h .

Preuve

On munit $\mathbb{R}^d$ de l'ordre lexicographique, noté $\prec$.

$$(x_1, x_2, \dots, x_d) \prec (y_1, y_2, \dots, y_d) \Leftrightarrow x_1 < y_1$$

ou $x_1 = y_1$ et $x_2 < y_2$

...

ou $(x_1, x_2, \dots, x_{d-1}) = (y_1, y_2, \dots, y_{d-1})$ et $x_d < y_d$

Tout compact $X \subset \mathbb{R}^d$ a un point maximum pour $\prec$, noté $\max_{\prec} X$.

Lemme. Pour toute famille finie $\mathcal{A}$ de compacts convexes de $\mathbb{R}^d$, il existe $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ tel que $|\mathcal{B}| \leq d$ et $\max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) = \max_{\prec} (\cap \mathcal{B})$.

$$\cap \mathcal{A} \stackrel{\text{def}}{=} \cap_{X \in \mathcal{A}} X.$$

$$p^* \stackrel{\text{def}}{=} \max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) \text{ et } h \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R}^d : p^* \prec x\},$$

$$\forall \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}, \quad \max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) \in \cap \mathcal{B}.$$

but : trouver $\mathcal{B}$ tel que $\cap \mathcal{B}$ évite h .

$$\cap (\mathcal{A} \cup \{h\}) = \emptyset \quad \text{Helly?}$$

Preuve

On munit $\mathbb{R}^d$ de l'ordre lexicographique, noté $\prec$.

$$(x_1, x_2, \dots, x_d) \prec (y_1, y_2, \dots, y_d) \Leftrightarrow x_1 < y_1$$

ou $x_1 = y_1$ et $x_2 < y_2$

...

ou $(x_1, x_2, \dots, x_{d-1}) = (y_1, y_2, \dots, y_{d-1})$ et $x_d < y_d$

Tout compact $X \subset \mathbb{R}^d$ a un point maximum pour $\prec$, noté $\max_{\prec} X$.

Lemme. Pour toute famille finie $\mathcal{A}$ de compacts convexes de $\mathbb{R}^d$, il existe $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ tel que $|\mathcal{B}| \leq d$ et $\max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) = \max_{\prec} (\cap \mathcal{B})$.

$$\cap \mathcal{A} \stackrel{\text{def}}{=} \cap_{X \in \mathcal{A}} X.$$

$$p^* \stackrel{\text{def}}{=} \max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) \text{ et } h \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R}^d : p^* \prec x\},$$

$$\forall \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}, \quad \max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) \in \cap \mathcal{B}.$$

but : trouver $\mathcal{B}$ tel que $\cap \mathcal{B}$ évite h .

$$\cap (\mathcal{A} \cup \{h\}) = \emptyset \quad \text{Helly}$$

$$\Rightarrow \exists \mathcal{B}' \subset \mathcal{A} \cup \{h\} \text{ tq } |\mathcal{B}'| \leq d + 1 \text{ et } \cap \mathcal{B}' = \emptyset.$$

Preuve

On munit $\mathbb{R}^d$ de l'ordre lexicographique, noté $\prec$.

$$(x_1, x_2, \dots, x_d) \prec (y_1, y_2, \dots, y_d) \Leftrightarrow x_1 < y_1$$

ou $x_1 = y_1$ et $x_2 < y_2$

...

ou $(x_1, x_2, \dots, x_{d-1}) = (y_1, y_2, \dots, y_{d-1})$ et $x_d < y_d$

Tout compact $X \subset \mathbb{R}^d$ a un point maximum pour $\prec$, noté $\max_{\prec} X$.

Lemme. Pour toute famille finie $\mathcal{A}$ de compacts convexes de $\mathbb{R}^d$, il existe $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ tel que $|\mathcal{B}| \leq d$ et $\max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) = \max_{\prec} (\cap \mathcal{B})$.

$$\cap \mathcal{A} \stackrel{\text{def}}{=} \cap_{X \in \mathcal{A}} X.$$

$$p^* \stackrel{\text{def}}{=} \max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) \text{ et } h \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R}^d : p^* \prec x\},$$

$$\forall \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}, \quad \max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) \in \cap \mathcal{B}.$$

but : trouver $\mathcal{B}$ tel que $\cap \mathcal{B}$ évite h .

$$\cap (\mathcal{A} \cup \{h\}) = \emptyset \quad \text{Helly}$$

$$\Rightarrow \exists \mathcal{B}' \subset \mathcal{A} \cup \{h\} \text{ tq } |\mathcal{B}'| \leq d + 1 \text{ et } \cap \mathcal{B}' = \emptyset.$$

$$\mathcal{B} \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{B}' \setminus \{h\} \text{ convient.}$$

Preuve

On munit $\mathbb{R}^d$ de l'ordre lexicographique, noté $\prec$.

$$(x_1, x_2, \dots, x_d) \prec (y_1, y_2, \dots, y_d) \Leftrightarrow x_1 < y_1$$

ou $x_1 = y_1$ et $x_2 < y_2$

...

ou $(x_1, x_2, \dots, x_{d-1}) = (y_1, y_2, \dots, y_{d-1})$ et $x_d < y_d$

Tout compact $X \subset \mathbb{R}^d$ a un point maximum pour $\prec$, noté $\max_{\prec} X$.

Lemme. Pour toute famille finie $\mathcal{A}$ de compacts convexes de $\mathbb{R}^d$, il existe $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ tel que $|\mathcal{B}| \leq d$ et $\max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) = \max_{\prec} (\cap \mathcal{B})$.

$$\cap \mathcal{A} \stackrel{\text{def}}{=} \cap_{X \in \mathcal{A}} X.$$

$$p^* \stackrel{\text{def}}{=} \max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) \text{ et } h \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R}^d : p^* \prec x\},$$

$$\forall \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}, \quad \max_{\prec} (\cap \mathcal{A}) \in \cap \mathcal{B}.$$

but : trouver $\mathcal{B}$ tel que $\cap \mathcal{B}$ évite h .

$$\cap (\mathcal{A} \cup \{h\}) = \emptyset \quad \text{Helly}$$

$$\Rightarrow \exists \mathcal{B}' \subset \mathcal{A} \cup \{h\} \text{ tq } |\mathcal{B}'| \leq d + 1 \text{ et } \cap \mathcal{B}' = \emptyset.$$

$$\mathcal{B} \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{B}' \setminus \{h\} \text{ convient. } \quad \square$$

Preuve

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si une fraction α de $\binom{\mathcal{F}}{d+1}$ sont d'intersection non vide, alors une fraction $\frac{\alpha}{d+1}$ de $\mathcal{F}$ a un point en commun.

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si une fraction α de $\binom{\mathcal{F}}{d+1}$ sont d'intersection non vide, alors une fraction $\frac{\alpha}{d+1}$ de $\mathcal{F}$ a un point en commun.

$\mathcal{A} \in \binom{\mathcal{F}}{d+1} \mapsto \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ de même $\max_{\prec}$ et taille d .
t. q. $\cap \mathcal{A} \neq \emptyset$

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si une fraction α de $\binom{\mathcal{F}}{d+1}$ sont d'intersection non vide, alors une fraction $\frac{\alpha}{d+1}$ de $\mathcal{F}$ a un point en commun.

$\mathcal{A} \in \binom{\mathcal{F}}{d+1} \mapsto \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ de même $\max_{\prec}$ et taille d .
t. q. $\cap \mathcal{A} \neq \emptyset$

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si une fraction α de $\binom{\mathcal{F}}{d+1}$ sont d'intersection non vide, alors une fraction $\frac{\alpha}{d+1}$ de $\mathcal{F}$ a un point en commun.

$\mathcal{A} \in \binom{\mathcal{F}}{d+1} \mapsto \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ de même $\max_{\prec}$ et taille d .
t. q. $\cap \mathcal{A} \neq \emptyset$

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si une fraction α de $\binom{\mathcal{F}}{d+1}$ sont d'intersection non vide, alors une fraction $\frac{\alpha}{d+1}$ de $\mathcal{F}$ a un point en commun.

$\mathcal{A} \in \binom{\mathcal{F}}{d+1} \mapsto \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ de même $\max_{\prec}$ et taille d .
t. q. $\cap \mathcal{A} \neq \emptyset$

Pour $\mathcal{B} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$, le nombre d'éléments de $\mathcal{F}$ contenant $\max_{\prec}(\cap \mathcal{B})$ est au moins $\geq d+1$ nombre de fois où $\mathcal{B}$ a été choisi.

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si une fraction α de $\binom{\mathcal{F}}{d+1}$ sont d'intersection non vide, alors une fraction $\frac{\alpha}{d+1}$ de $\mathcal{F}$ a un point en commun.

$\mathcal{A} \in \binom{\mathcal{F}}{d+1} \mapsto \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ de même $\max_{\prec}$ et taille d .
t. q. $\cap \mathcal{A} \neq \emptyset$

Pour $\mathcal{B} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$, le nombre d'éléments de $\mathcal{F}$ contenant $\max_{\prec}(\cap \mathcal{B})$ est au moins $\geq d+1$ nombre de fois où $\mathcal{B}$ a été choisi.

$\exists \mathcal{B}_0 \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ choisi au moins $\frac{\alpha \binom{|\mathcal{F}|}{d+1}}{\binom{|\mathcal{F}|}{d}} = \frac{\alpha}{d+1} (|\mathcal{F}| - d)$ fois.

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si une fraction α de $\binom{\mathcal{F}}{d+1}$ sont d'intersection non vide, alors une fraction $\frac{\alpha}{d+1}$ de $\mathcal{F}$ a un point en commun.

$\mathcal{A} \in \binom{\mathcal{F}}{d+1} \mapsto \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ de même $\max_{\prec}$ et taille d .
t. q. $\cap \mathcal{A} \neq \emptyset$

Pour $\mathcal{B} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$, le nombre d'éléments de $\mathcal{F}$ contenant $\max_{\prec}(\cap \mathcal{B})$ est au moins $\geq d +$ nombre de fois où $\mathcal{B}$ a été choisi.

$\exists \mathcal{B}_0 \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ choisi au moins $\frac{\alpha \binom{|\mathcal{F}|}{d+1}}{\binom{|\mathcal{F}|}{d}} = \frac{\alpha}{d+1} (|\mathcal{F}| - d)$ fois.

$\max_{\prec}(\cap \mathcal{B}_0)$ appartient à au moins $d + \frac{\alpha}{d+1} (|\mathcal{F}| - d)$ éléments de $\mathcal{F}$.

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si une fraction α de $\binom{\mathcal{F}}{d+1}$ sont d'intersection non vide, alors une fraction $\frac{\alpha}{d+1}$ de $\mathcal{F}$ a un point en commun.

$\mathcal{A} \in \binom{\mathcal{F}}{d+1} \mapsto \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ de même $\max_{\prec}$ et taille d .
t. q. $\cap \mathcal{A} \neq \emptyset$

Pour $\mathcal{B} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$, le nombre d'éléments de $\mathcal{F}$ contenant $\max_{\prec}(\cap \mathcal{B})$ est au moins $\geq d +$ nombre de fois où $\mathcal{B}$ a été choisi.

$\exists \mathcal{B}_0 \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ choisi au moins $\frac{\alpha \binom{|\mathcal{F}|}{d+1}}{\binom{|\mathcal{F}|}{d}} = \frac{\alpha}{d+1} (|\mathcal{F}| - d)$ fois.

$\max_{\prec}(\cap \mathcal{B}_0)$ appartient à au moins $d + \frac{\alpha}{d+1} (|\mathcal{F}| - d) \geq \frac{\alpha}{d+1} |\mathcal{F}|$ éléments de $\mathcal{F}$.

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si une fraction α de $\binom{\mathcal{F}}{d+1}$ sont d'intersection non vide, alors une fraction $\frac{\alpha}{d+1}$ de $\mathcal{F}$ a un point en commun.

$\mathcal{A} \in \binom{\mathcal{F}}{d+1} \mapsto \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ de même $\max_{\prec}$ et taille d .
t. q. $\cap \mathcal{A} \neq \emptyset$

Pour $\mathcal{B} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$, le nombre d'éléments de $\mathcal{F}$ contenant $\max_{\prec}(\cap \mathcal{B})$ est au moins $\geq d +$ nombre de fois où $\mathcal{B}$ a été choisi.

$\exists \mathcal{B}_0 \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ choisi au moins $\frac{\alpha \binom{|\mathcal{F}|}{d+1}}{\binom{|\mathcal{F}|}{d}} = \frac{\alpha}{d+1} (|\mathcal{F}| - d)$ fois.

$\max_{\prec}(\cap \mathcal{B}_0)$ appartient à au moins $d + \frac{\alpha}{d+1} (|\mathcal{F}| - d) \geq \frac{\alpha}{d+1} |\mathcal{F}|$ éléments de $\mathcal{F}$. $\square$

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si une fraction α de $\binom{\mathcal{F}}{d+1}$ sont d'intersection non vide, alors une fraction $\frac{\alpha}{d+1}$ de $\mathcal{F}$ a un point en commun.

$\mathcal{A} \in \binom{\mathcal{F}}{d+1} \mapsto \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ de même $\max_{\prec}$ et taille d .
 t. q. $\cap \mathcal{A} \neq \emptyset$

Pour $\mathcal{B} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$, le nombre d'éléments de $\mathcal{F}$ contenant $\max_{\prec}(\cap \mathcal{B})$ est au moins $\geq d +$ nombre de fois où $\mathcal{B}$ a été choisi.

$\exists \mathcal{B}_0 \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ choisi au moins $\frac{\alpha \binom{|\mathcal{F}|}{d+1}}{\binom{|\mathcal{F}|}{d}} = \frac{\alpha}{d+1} (|\mathcal{F}| - d)$ fois.

$\max_{\prec}(\cap \mathcal{B}_0)$ appartient à au moins $d + \frac{\alpha}{d+1} (|\mathcal{F}| - d) \geq \frac{\alpha}{d+1} |\mathcal{F}|$ éléments de $\mathcal{F}$. $\square$

Le terme $\frac{\alpha}{d+1}$ n'est pas optimal.

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si une fraction α de $\binom{\mathcal{F}}{d+1}$ sont d'intersection non vide, alors une fraction $\frac{\alpha}{d+1}$ de $\mathcal{F}$ a un point en commun.

$\mathcal{A} \in \binom{\mathcal{F}}{d+1} \mapsto \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ de même $\max_{\prec}$ et taille d .
t. q. $\cap \mathcal{A} \neq \emptyset$

Pour $\mathcal{B} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$, le nombre d'éléments de $\mathcal{F}$ contenant $\max_{\prec}(\cap \mathcal{B})$ est au moins $\geq d +$ nombre de fois où $\mathcal{B}$ a été choisi.

$\exists \mathcal{B}_0 \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ choisi au moins $\frac{\alpha \binom{|\mathcal{F}|}{d+1}}{\binom{|\mathcal{F}|}{d}} = \frac{\alpha}{d+1} (|\mathcal{F}| - d)$ fois.

$\max_{\prec}(\cap \mathcal{B}_0)$ appartient à au moins $d + \frac{\alpha}{d+1} (|\mathcal{F}| - d) \geq \frac{\alpha}{d+1} |\mathcal{F}|$ éléments de $\mathcal{F}$. $\square$

Le terme $\frac{\alpha}{d+1}$ n'est pas optimal. En fait, une fraction $1 - (1 - \alpha)^{\frac{1}{d+1}}$ de $\mathcal{F}$ a un point en commun.

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si une fraction α de $\binom{\mathcal{F}}{d+1}$ sont d'intersection non vide, alors une fraction $\frac{\alpha}{d+1}$ de $\mathcal{F}$ a un point en commun.

Le terme $\frac{\alpha}{d+1}$ n'est pas optimal. En fait, une fraction $1 - (1 - \alpha)^{\frac{1}{d+1}}$ de $\mathcal{F}$ a un point en commun.

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si une fraction α de $\binom{\mathcal{F}}{d+1}$ sont d'intersection non vide, alors une fraction $\frac{\alpha}{d+1}$ de $\mathcal{F}$ a un point en commun.

Le terme $\frac{\alpha}{d+1}$ n'est pas optimal. En fait, une fraction $1 - (1 - \alpha)^{\frac{1}{d+1}}$ de $\mathcal{F}$ a un point en commun.

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si une fraction α de $\binom{\mathcal{F}}{d+1}$ sont d'intersection non vide, alors une fraction $\frac{\alpha}{d+1}$ de $\mathcal{F}$ a un point en commun.

Le terme $\frac{\alpha}{d+1}$ n'est pas optimal. En fait, une fraction $1 - (1 - \alpha)^{\frac{1}{d+1}}$ de $\mathcal{F}$ a un point en commun.

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si une fraction α de $\binom{\mathcal{F}}{d+1}$ sont d'intersection non vide, alors une fraction $\frac{\alpha}{d+1}$ de $\mathcal{F}$ a un point en commun.

Le terme $\frac{\alpha}{d+1}$ n'est pas optimal. En fait, une fraction $1 - (1 - \alpha)^{\frac{1}{d+1}}$ de $\mathcal{F}$ a un point en commun.

Preuve combinatoire, idées topologiques... semaine prochaine!

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si une fraction α de $\binom{\mathcal{F}}{d+1}$ sont d'intersection non vide, alors une fraction $\frac{\alpha}{d+1}$ de $\mathcal{F}$ a un point en commun.

Le terme $\frac{\alpha}{d+1}$ n'est pas optimal. En fait, une fraction $1 - (1 - \alpha)^{\frac{1}{d+1}}$ de $\mathcal{F}$ a un point en commun.

Preuve combinatoire, idées topologiques... semaine prochaine!

Voyons des applications...

6. Applications à la programmation linéaire

6. Applications à la programmation linéaire

Minimisation d'une fonction **linéaire** sous contraintes **linéaires**.

6. Applications à la programmation linéaire

Minimisation d'une fonction **linéaire** sous contraintes **linéaires**.

S'exprime en terme d'**intersections** de **demi-espaces**.

6. Applications à la programmation linéaire

Minimisation d'une fonction **linéaire** sous contraintes **linéaires**.

S'exprime en terme d'**intersections** de **demi-espaces**.

S'analyse via **Helly** et **Helly fractionnaire**.

6. Applications à la programmation linéaire

Minimisation d'une fonction **linéaire** sous contraintes **linéaires**.

S'exprime en terme d'**intersections** de **demi-espaces**.

S'analyse via **Helly** et **Helly fractionnaire**.

Les résultats se généralisent à la **programmation convexe** et au-delà...

Un programme linéaire (**PL**) est un problème qui consiste à minimiser **sur** $\mathbb{R}^d$ une fonction **linéaire** sous des contraintes **linéaires**.

$$\min \quad x_2 - x_1$$

$$\text{t.q.} \quad x_1 \geq 0$$

$$2x_2 - x_1 \leq 2$$

$$x_1 + x_2 \geq 0$$

$$x_2 - 2x_1 \geq -4$$

Un programme linéaire (**PL**) est un problème qui consiste à minimiser **sur** $\mathbb{R}^d$ une fonction **linéaire** sous des contraintes **linéaires**.

$$\min \quad x_2 - x_1$$

$$\text{t.q.} \quad x_1 \geq 0$$

$$2x_2 - x_1 \leq 2$$

$$x_1 + x_2 \geq 0$$

$$x_2 - 2x_1 \geq -4$$

Un programme linéaire (**PL**) est un problème qui consiste à minimiser **sur** $\mathbb{R}^d$ une fonction **linéaire** sous des contraintes **linéaires**.

$$\min \quad x_2 - x_1$$

$$\text{t.q.} \quad x_1 \geq 0$$

$$2x_2 - x_1 \leq 2$$

$$x_1 + x_2 \geq 0$$

$$x_2 - 2x_1 \geq -4$$

Un programme linéaire (**PL**) est un problème qui consiste à minimiser **sur** $\mathbb{R}^d$ une fonction **linéaire** sous des contraintes **linéaires**.

$$\min \quad x_2 - x_1$$

$$\text{t.q.} \quad x_1 \geq 0$$

$$2x_2 - x_1 \leq 2$$

$$x_1 + x_2 \geq 0$$

$$x_2 - 2x_1 \geq -4$$

Un programme linéaire (**PL**) est un problème qui consiste à minimiser **sur** $\mathbb{R}^d$ une fonction **linéaire** sous des contraintes **linéaires**.

$$\begin{array}{ll} \min & x_2 - x_1 \\ \text{t.q.} & x_1 \geq 0 \\ & 2x_2 - x_1 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 \geq 0 \\ & x_2 - 2x_1 \geq -4 \end{array}$$

Un programme linéaire (**PL**) est un problème qui consiste à minimiser **sur** $\mathbb{R}^d$ une fonction **linéaire** sous des contraintes **linéaires**.

$$\begin{array}{ll} \min & x_2 - x_1 \\ \text{t.q.} & x_1 \geq 0 \\ & 2x_2 - x_1 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 \geq 0 \\ & x_2 - 2x_1 \geq -4 \end{array}$$

Un programme linéaire (**PL**) est un problème qui consiste à minimiser **sur** $\mathbb{R}^d$ une fonction **linéaire** sous des contraintes **linéaires**.

$$\begin{array}{ll} \min & x_2 - x_1 \\ \text{t.q.} & x_1 \geq 0 \\ & 2x_2 - x_1 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 \geq 0 \\ & x_2 - 2x_1 \geq -4 \end{array}$$

Un programme linéaire (**PL**) est un problème qui consiste à minimiser **sur** $\mathbb{R}^d$ une fonction **linéaire** sous des contraintes **linéaires**.

$$\begin{array}{ll} \min & x_2 - x_1 \\ \text{t.q.} & x_1 \geq 0 \\ & 2x_2 - x_1 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 \geq 0 \\ & x_2 - 2x_1 \geq -4 \end{array}$$

Un programme linéaire (**PL**) est un problème qui consiste à minimiser **sur** $\mathbb{R}^d$ une fonction **linéaire** sous des contraintes **linéaires**.

$$\begin{array}{ll} \min & x_2 - x_1 \\ \text{t.q.} & x_1 \geq 0 \\ & 2x_2 - x_1 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 \geq 0 \\ & x_2 - 2x_1 \geq -4 \end{array}$$

Une forme générale

$$\begin{array}{ll} \min & c^T x \\ \text{t. q.} & Ax \leq b \end{array} \quad \begin{array}{l} x \in \mathbb{R}^d \text{ un vecteur d'indéterminées} \\ c \in \mathbb{R}^d, A \in \mathbb{R}^{n \times d}, b \in \mathbb{R}^n \text{ des constantes.} \end{array}$$

Un programme linéaire (**PL**) est un problème qui consiste à minimiser **sur** $\mathbb{R}^d$ une fonction **linéaire** sous des contraintes **linéaires**.

$$\begin{array}{ll} \min & x_2 - x_1 \\ \text{t.q.} & x_1 \geq 0 \\ & 2x_2 - x_1 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 \geq 0 \\ & x_2 - 2x_1 \geq -4 \end{array}$$

Une forme générale

$$\begin{array}{ll} \min & c^T x \\ \text{t. q.} & Ax \leq b \end{array} \quad \begin{array}{l} x \in \mathbb{R}^d \text{ un vecteur d'indéterminées} \\ c \in \mathbb{R}^d, A \in \mathbb{R}^{n \times d}, b \in \mathbb{R}^n \text{ des constantes.} \end{array}$$

Un programme linéaire (**PL**) est un problème qui consiste à minimiser **sur** $\mathbb{R}^d$ une fonction **linéaire** sous des contraintes **linéaires**.

$$\begin{aligned} \min \quad & x_2 - x_1 \\ \text{t.q.} \quad & x_1 \geq 0 \\ & 2x_2 - x_1 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 \geq 0 \\ & x_2 - 2x_1 \geq -4 \end{aligned}$$

Une forme générale

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T x && x \in \mathbb{R}^d \text{ un vecteur d'indéterminées} \\ \text{t. q.} \quad & Ax \leq b && c \in \mathbb{R}^d, A \in \mathbb{R}^{n \times d}, b \in \mathbb{R}^n \text{ des constantes.} \end{aligned}$$

$D_i \stackrel{\text{def}}{=} \{x : (Ax)_i \leq b_i\}$ un **demi-espace** de $\mathbb{R}^d$.

Un programme linéaire (**PL**) est un problème qui consiste à minimiser **sur** $\mathbb{R}^d$ une fonction **linéaire** sous des contraintes **linéaires**.

$$\begin{aligned} \min \quad & x_2 - x_1 \\ \text{t.q.} \quad & x_1 \geq 0 \\ & 2x_2 - x_1 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 \geq 0 \\ & x_2 - 2x_1 \geq -4 \end{aligned}$$

Une forme générale

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T x && x \in \mathbb{R}^d \text{ un vecteur d'indéterminées} \\ \text{t. q.} \quad & Ax \leq b && c \in \mathbb{R}^d, A \in \mathbb{R}^{n \times d}, b \in \mathbb{R}^n \text{ des constantes.} \end{aligned}$$

$D_i \stackrel{\text{def}}{=} \{x : (Ax)_i \leq b_i\}$ un **demi-espace** de $\mathbb{R}^d$.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$

Un programme linéaire (**PL**) est un problème qui consiste à minimiser **sur** $\mathbb{R}^d$ une fonction **linéaire** sous des contraintes **linéaires**.

$$\begin{aligned} \min \quad & x_2 - x_1 \\ \text{t.q.} \quad & x_1 \geq 0 \\ & 2x_2 - x_1 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 \geq 0 \\ & x_2 - 2x_1 \geq -4 \end{aligned}$$

Une forme générale

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T x && x \in \mathbb{R}^d \text{ un vecteur d'indéterminées} \\ \text{t. q.} \quad & Ax \leq b && c \in \mathbb{R}^d, A \in \mathbb{R}^{n \times d}, b \in \mathbb{R}^n \text{ des constantes.} \end{aligned}$$

$$D_i \stackrel{\text{def}}{=} \{x : (Ax)_i \leq b_i\} \text{ un demi-espace de } \mathbb{R}^d. \quad \mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$$

$$(\text{PL}) \text{ est faisable} \Leftrightarrow \bigcap \mathcal{F} \neq \emptyset.$$

Un programme linéaire (**PL**) est un problème qui consiste à minimiser **sur** $\mathbb{R}^d$ une fonction **linéaire** sous des contraintes **linéaires**.

$$\begin{array}{ll} \min & x_2 - x_1 \\ \text{t.q.} & x_1 \geq 0 \\ & 2x_2 - x_1 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 \geq 0 \\ & x_2 - 2x_1 \geq -4 \end{array}$$

Une forme générale

$$\begin{array}{ll} \min & c^T x \\ \text{t. q.} & Ax \leq b \end{array} \quad \begin{array}{l} x \in \mathbb{R}^d \text{ un vecteur d'indéterminées} \\ c \in \mathbb{R}^d, A \in \mathbb{R}^{n \times d}, b \in \mathbb{R}^n \text{ des constantes.} \end{array}$$

$$D_i \stackrel{\text{def}}{=} \{x : (Ax)_i \leq b_i\} \text{ un demi-espace de } \mathbb{R}^d. \quad \mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$$

$$\text{(PL) est faisable} \Leftrightarrow \cap \mathcal{F} \neq \emptyset.$$

$$\text{Valeur de (PL)} \leq t \Leftrightarrow \cap (\mathcal{F} \cup \{h_t\}) \neq \emptyset \text{ avec } h_t \stackrel{\text{def}}{=} \{x : c^T x \leq t\}.$$

Un programme linéaire (**PL**) est un problème qui consiste à minimiser **sur** $\mathbb{R}^d$ une fonction **linéaire** sous des contraintes **linéaires**.

$$\begin{array}{ll} \min & x_2 - x_1 \\ \text{t.q.} & x_1 \geq 0 \\ & 2x_2 - x_1 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 \geq 0 \\ & x_2 - 2x_1 \geq -4 \end{array}$$

Une forme générale

$$\begin{array}{ll} \min & c^T x \\ \text{t. q.} & Ax \leq b \end{array} \quad \begin{array}{l} x \in \mathbb{R}^d \text{ un vecteur d'indéterminées} \\ c \in \mathbb{R}^d, A \in \mathbb{R}^{n \times d}, b \in \mathbb{R}^n \text{ des constantes.} \end{array}$$

$$D_i \stackrel{\text{def}}{=} \{x : (Ax)_i \leq b_i\} \text{ un demi-espace de } \mathbb{R}^d. \quad \mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$$

$$\text{(PL) est faisable} \Leftrightarrow \bigcap \mathcal{F} \neq \emptyset.$$

$$\text{Valeur de (PL)} \leq t \Leftrightarrow \bigcap (\mathcal{F} \cup \{h_t\}) \neq \emptyset \text{ avec } h_t \stackrel{\text{def}}{=} \{x : c^T x \leq t\}.$$

$$\text{Valeur de (PL)} = \min \{t : \bigcap (\mathcal{F} \cup \{h_t\}) \neq \emptyset\}$$

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\min_{x \in \cap \mathcal{F}} c^T x$$

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\min_{x \in \cap \mathcal{F}} c^T x$$

Deux hypothèses "simplificatrices"

Faisable $\stackrel{\text{def}}{:}$ $\cap \mathcal{F} \neq \emptyset$

Générique $\stackrel{\text{def}}{:}$ L'optimum est unique.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\min_{x \in \cap \mathcal{F}} c^T x$$

Deux hypothèses "simplificatrices"

Faisable $\stackrel{\text{def}}{:}$ $\cap \mathcal{F} \neq \emptyset$

Générique $\stackrel{\text{def}}{:}$ L'optimum est unique.

On va travailler sur des sous-programmes :

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\min_{x \in \cap \mathcal{F}} c^T x = \text{val}(\mathcal{F}).$$

Deux hypothèses "simplificatrices"

Faisable $\stackrel{\text{def}}{:}$ $\cap \mathcal{F} \neq \emptyset$

Générique $\stackrel{\text{def}}{:}$ L'optimum est unique.

On va travailler sur des sous-programmes :

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\min_{x \in \mathcal{F}} c^T x = \text{val}(\mathcal{F}).$$

Deux hypothèses "simplificatrices"

Faisable $\stackrel{\text{def}}{:}$ $\cap \mathcal{F} \neq \emptyset$

Générique $\stackrel{\text{def}}{:}$ L'optimum est unique.

On va travailler sur des sous-programmes :

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \mathcal{R}} c^T x$$

$$\forall \mathcal{R} \subseteq \mathcal{F}, \quad \text{val}(\mathcal{R}) \leq \text{val}(\mathcal{F}).$$

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\min_{x \in \cap \mathcal{F}} c^T x = \text{val}(\mathcal{F}).$$

Deux hypothèses "simplificatrices"

Faisable $\stackrel{\text{def}}{:}$ $\cap \mathcal{F} \neq \emptyset$

Générique $\stackrel{\text{def}}{:}$ L'optimum est unique.

On va travailler sur des sous-programmes :

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

$$\forall \mathcal{R} \subseteq \mathcal{F}, \quad \text{val}(\mathcal{R}) \leq \text{val}(\mathcal{F}).$$

Lemme. Il existe $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ tel que $\text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{F})$.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\min_{x \in \mathcal{F}} c^T x = \text{val}(\mathcal{F}).$$

Deux hypothèses "simplificatrices"

Faisable $\stackrel{\text{def}}{:}$ $\cap \mathcal{F} \neq \emptyset$

Générique $\stackrel{\text{def}}{:}$ L'optimum est unique.

On va travailler sur des sous-programmes :

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \mathcal{R}} c^T x$$

$$\forall \mathcal{R} \subseteq \mathcal{F}, \quad \text{val}(\mathcal{R}) \leq \text{val}(\mathcal{F}).$$

Lemme. Il existe $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ tel que $\text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{F})$.

Preuve

$h \stackrel{\text{def}}{=} \{x : c^T x < \text{val}(\mathcal{F})\}$ est un demi-espace ouvert.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\min_{x \in \cap \mathcal{F}} c^T x = \text{val}(\mathcal{F}).$$

Deux hypothèses "simplificatrices"

Faisable $\stackrel{\text{def}}{:}$ $\cap \mathcal{F} \neq \emptyset$

Générique $\stackrel{\text{def}}{:}$ L'optimum est unique.

On va travailler sur des sous-programmes :

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

$$\forall \mathcal{R} \subseteq \mathcal{F}, \quad \text{val}(\mathcal{R}) \leq \text{val}(\mathcal{F}).$$

Lemme. Il existe $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ tel que $\text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{F})$.

Preuve

$h \stackrel{\text{def}}{=} \{x : c^T x < \text{val}(\mathcal{F})\}$ est un demi-espace ouvert.

$\mathcal{F} \cup \{h\}$ est d'intersection vide.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\min_{x \in \cap \mathcal{F}} c^T x = \text{val}(\mathcal{F}).$$

Deux hypothèses "simplificatrices"

Faisable $\stackrel{\text{def}}{:}$ $\cap \mathcal{F} \neq \emptyset$

Générique $\stackrel{\text{def}}{:}$ L'optimum est unique.

On va travailler sur des **sous-programmes** :

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

$$\forall \mathcal{R} \subseteq \mathcal{F}, \quad \text{val}(\mathcal{R}) \leq \text{val}(\mathcal{F}).$$

Lemme. Il existe $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ tel que $\text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{F})$.

Preuve

$h \stackrel{\text{def}}{=} \{x : c^T x < \text{val}(\mathcal{F})\}$ est un demi-espace ouvert.

$\mathcal{F} \cup \{h\}$ est d'intersection vide.

Helly $\Rightarrow \exists \mathcal{R}' \subseteq \mathcal{F}$ t. q. $|\mathcal{R}'| \leq d + 1$ et $\cap \mathcal{R}' = \emptyset$.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\min_{x \in \cap \mathcal{F}} c^T x = \text{val}(\mathcal{F}).$$

Deux hypothèses "simplificatrices"

Faisable $\stackrel{\text{def}}{:}$ $\cap \mathcal{F} \neq \emptyset$

Générique $\stackrel{\text{def}}{:}$ L'optimum est unique.

On va travailler sur des sous-programmes :

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

$$\forall \mathcal{R} \subseteq \mathcal{F}, \quad \text{val}(\mathcal{R}) \leq \text{val}(\mathcal{F}).$$

Lemme. Il existe $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ tel que $\text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{F})$.

Preuve

$h \stackrel{\text{def}}{=} \{x : c^T x < \text{val}(\mathcal{F})\}$ est un demi-espace ouvert.

$\mathcal{F} \cup \{h\}$ est d'intersection vide.

Helly $\Rightarrow \exists \mathcal{R}' \subseteq \mathcal{F}$ t. q. $|\mathcal{R}'| \leq d + 1$ et $\cap \mathcal{R}' = \emptyset$.

$h \in \mathcal{R}'$. Posons $\mathcal{R} \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{R}' \setminus \{h\}$.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\min_{x \in \cap \mathcal{F}} c^T x = \text{val}(\mathcal{F}).$$

Deux hypothèses "simplificatrices"

Faisable $\stackrel{\text{def}}{:}$ $\cap \mathcal{F} \neq \emptyset$

Générique $\stackrel{\text{def}}{:}$ L'optimum est unique.

On va travailler sur des **sous-programmes** :

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

$$\forall \mathcal{R} \subseteq \mathcal{F}, \quad \text{val}(\mathcal{R}) \leq \text{val}(\mathcal{F}).$$

Lemme. Il existe $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ tel que $\text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{F})$.

Preuve

$h \stackrel{\text{def}}{=} \{x : c^T x < \text{val}(\mathcal{F})\}$ est un demi-espace ouvert.

$\mathcal{F} \cup \{h\}$ est d'intersection vide.

Helly $\Rightarrow \exists \mathcal{R}' \subseteq \mathcal{F}$ t. q. $|\mathcal{R}'| \leq d + 1$ et $\cap \mathcal{R}' = \emptyset$.

$h \in \mathcal{R}'$. Posons $\mathcal{R} \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{R}' \setminus \{h\}$.

$\cap \mathcal{R}$ disjoint de $h \Rightarrow \text{val}(\mathcal{R}) \geq \text{val}(\mathcal{F})$.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\min_{x \in \cap \mathcal{F}} c^T x = \text{val}(\mathcal{F}).$$

Deux hypothèses "simplificatrices"

Faisable $\stackrel{\text{def}}{:}$ $\cap \mathcal{F} \neq \emptyset$

Générique $\stackrel{\text{def}}{:}$ L'optimum est unique.

On va travailler sur des **sous-programmes** :

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

$$\forall \mathcal{R} \subseteq \mathcal{F}, \quad \text{val}(\mathcal{R}) \leq \text{val}(\mathcal{F}).$$

Lemme. Il existe $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ tel que $\text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{F})$.

Preuve

$h \stackrel{\text{def}}{=} \{x : c^T x < \text{val}(\mathcal{F})\}$ est un demi-espace ouvert.

$\mathcal{F} \cup \{h\}$ est d'intersection vide.

Helly $\Rightarrow \exists \mathcal{R}' \subseteq \mathcal{F}$ t. q. $|\mathcal{R}'| \leq d + 1$ et $\cap \mathcal{R}' = \emptyset$.

$h \in \mathcal{R}'$. Posons $\mathcal{R} \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{R}' \setminus \{h\}$.

$\cap \mathcal{R}$ disjoint de $h \Rightarrow \text{val}(\mathcal{R}) \geq \text{val}(\mathcal{F})$. $\square$

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\min_{x \in \mathcal{F}} c^T x = \text{val}(\mathcal{F}).$$

Deux hypothèses "simplificatrices"

Faisable $\stackrel{\text{def}}{:}$ $\cap \mathcal{F} \neq \emptyset$

Générique $\stackrel{\text{def}}{:}$ L'optimum est unique.

On va travailler sur des **sous-programmes** :

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \mathcal{R}} c^T x$$

$$\forall \mathcal{R} \subseteq \mathcal{F}, \quad \text{val}(\mathcal{R}) \leq \text{val}(\mathcal{F}).$$

Lemme. Il existe $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ tel que $\text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{F})$.

Preuve

$h \stackrel{\text{def}}{=} \{x : c^T x < \text{val}(\mathcal{F})\}$ est un demi-espace ouvert.

$\mathcal{F} \cup \{h\}$ est d'intersection vide.

Helly $\Rightarrow \exists \mathcal{R}' \subseteq \mathcal{F}$ t. q. $|\mathcal{R}'| \leq d + 1$ et $\cap \mathcal{R}' = \emptyset$.

$h \in \mathcal{R}'$. Posons $\mathcal{R} \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{R}' \setminus \{h\}$.

$\cap \mathcal{R}$ disjoint de $h \Rightarrow \text{val}(\mathcal{R}) \geq \text{val}(\mathcal{F})$. $\square$

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\min_{x \in \mathcal{F}} c^T x = \text{val}(\mathcal{F})$.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\min_{x \in \mathcal{F}} c^T x = \text{val}(\mathcal{F})$.

Quand $\# \text{contraintes} \gg \# \text{variables}$, la **plupart** des contraintes sont inutiles :

Lemme. Il existe $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ tel que $\text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{F})$.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\min_{x \in \mathcal{F}} c^T x = \text{val}(\mathcal{F})$.

Quand $\#$ contraintes $\gg$ $\#$ variables, la **plupart** des contraintes sont inutiles :

Lemme. Il existe $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ tel que $\text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{F})$.

Quelle information peut-on tirer de **petits** $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ **aléatoires** ?

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \mapsto \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \mathcal{R}} c^T x$

On cherche $\min_{x \in \mathcal{F}} c^T x = \text{val}(\mathcal{F})$.

Quand $\# \text{contraintes} \gg \# \text{variables}$, la **plupart** des contraintes sont inutiles :

Lemme. Il existe $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ tel que $\text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{F})$.

Quelle information peut-on tirer de **petits** $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ **aléatoires** ?

Deux intérêts : Comprendre le problème de PL (algorithme fortement polynomial ?)

Généralisables à des **problèmes de type PL**.

1er algorithme

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$ $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$ On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

Fixons $v \in \mathbb{R}$ et testons si $\text{val}(\mathcal{F}) \leq v$.

Répéter k fois :

Choisir $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ uniformément au hasard.

Si $\text{val}(\mathcal{R}) > v$ répondre NON.

Répondre OUI.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

Fixons $v \in \mathbb{R}$ et testons si $\text{val}(\mathcal{F}) \leq v$.

Répéter k fois :

Choisir $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ uniformément au hasard.

Si $\text{val}(\mathcal{R}) > v$ répondre NON.

Répondre OUI.

Cette réponse est **toujours** correcte.

$$\forall \mathcal{R} \subseteq \mathcal{F}, \quad \text{val}(\mathcal{R}) \leq \text{val}(\mathcal{F}).$$

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \mapsto \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

Fixons $v \in \mathbb{R}$ et testons si $\text{val}(\mathcal{F}) \leq v$.

Répéter k fois :

Choisir $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ uniformément au hasard.

Si $\text{val}(\mathcal{R}) > v$ répondre NON.

Répondre OUI.

Cette réponse est **toujours** correcte.

$$\forall \mathcal{R} \subseteq \mathcal{F}, \quad \text{val}(\mathcal{R}) \leq \text{val}(\mathcal{F}).$$

Cette réponse **peut être** fausse.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

Fixons $v \in \mathbb{R}$ et testons si $\text{val}(\mathcal{F}) \leq v$.

Répéter k fois :

Choisir $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ uniformément au hasard.

Si $\text{val}(\mathcal{R}) > v$ répondre NON.

Répondre OUI.

Cette réponse est **toujours** correcte.

$$\forall \mathcal{R} \subseteq \mathcal{F}, \quad \text{val}(\mathcal{R}) \leq \text{val}(\mathcal{F}).$$

Cette réponse **peut être** fausse.

Si $\text{val}(\mathcal{F}) > v$, l'algorithme a une probabilité > 0 de répondre NON.

$$\exists \mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}, \quad \text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{F}).$$

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \mapsto \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

Fixons $v \in \mathbb{R}$ et testons si $\text{val}(\mathcal{F}) \leq v$.

Répéter k fois :

Choisir $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ uniformément au hasard.

Si $\text{val}(\mathcal{R}) > v$ répondre NON.

Répondre OUI.

Cette réponse est **toujours** correcte.

$$\forall \mathcal{R} \subseteq \mathcal{F}, \quad \text{val}(\mathcal{R}) \leq \text{val}(\mathcal{F}).$$

Cette réponse **peut être** fausse.

Si $\text{val}(\mathcal{F}) > v$, l'algorithme a une probabilité > 0 de répondre NON.

$$\exists \mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}, \quad \text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{F}).$$

Helly fractionnaire relie la **probabilité de réussite** au nombre minimum de contraintes à supprimer pour que la valeur devienne $\leq v$.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$ $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \mapsto \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \mathcal{R}} c^T x$ On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

Fixons $v \in \mathbb{R}$ et testons si $\text{val}(\mathcal{F}) \leq v$.

Répéter k fois :

Choisir $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ uniformément au hasard.

Si $\text{val}(\mathcal{R}) > v$ répondre NON. ←

Répondre OUI. ←

Cette réponse est **toujours** correcte.

$$\forall \mathcal{R} \subseteq \mathcal{F}, \quad \text{val}(\mathcal{R}) \leq \text{val}(\mathcal{F}).$$

Cette réponse **peut être** fausse.

Si $\text{val}(\mathcal{F}) > v$, l'algorithme a une probabilité > 0 de répondre NON. $\exists \mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}, \quad \text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{F})$.

Helly fractionnaire relie la **probabilité de réussite** au nombre minimum de contraintes à supprimer pour que la valeur devienne $\leq v$.

Un programme linéaire est ϵ -loin d'avoir valeur $\leq v$ si **tout** point de $\{x : c^T x \leq v\}$ viole **au moins** ϵn contraintes.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$ $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \mapsto \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \mathcal{R}} c^T x$ On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

Fixons $v \in \mathbb{R}$ et testons si $\text{val}(\mathcal{F}) \leq v$.

Répéter k fois :

 Choisir $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ uniformément au hasard.

 Si $\text{val}(\mathcal{R}) > v$ répondre NON.

 Répondre OUI.

Cette réponse est **toujours** correcte.

$$\forall \mathcal{R} \subseteq \mathcal{F}, \quad \text{val}(\mathcal{R}) \leq \text{val}(\mathcal{F}).$$

Cette réponse **peut être** fausse.

Si $\text{val}(\mathcal{F}) > v$, l'algorithme a une probabilité > 0 de répondre NON. $\exists \mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}, \quad \text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{F})$.

Helly fractionnaire relie la **probabilité de réussite** au nombre minimum de contraintes à supprimer pour que la valeur devienne $\leq v$.

Un programme linéaire est ϵ -loin d'avoir valeur $\leq v$ si **tout** point de $\{x : c^T x \leq v\}$ viole **au moins** ϵn contraintes.

Répéter k fois :

Choisir $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ uniformément au hasard.

Si $\text{val}(\mathcal{R}) > v$ répondre NON.

Répondre OUI.

Répéter k fois :

Choisir $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ uniformément au hasard.

Si $\text{val}(\mathcal{R}) > v$ répondre NON.

Répondre OUI. Probabilité d'erreur ?

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si **une fraction α des $X \in \binom{\mathcal{F}}{d+1}$** sont d'intersection non vide, alors **une fraction $1 - (1 - \alpha)^{\frac{1}{d+1}}$ de $\mathcal{F}$** a un point en commun.

Un programme linéaire est ϵ -loin d'avoir valeur $\leq v$ si il faut supprimer une fraction $\geq \epsilon$ de ses contraintes pour que le programme restant ait valeur $\leq v$.

Répéter k fois :

Choisir $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ uniformément au hasard.

Si $\text{val}(\mathcal{R}) > v$ répondre NON.

Répondre OUI. $\longleftarrow$ Probabilité d'erreur ?

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si **une fraction α des $X \in \binom{\mathcal{F}}{d+1}$** sont d'intersection non vide, alors **une fraction $1 - (1 - \alpha)^{\frac{1}{d+1}}$ de $\mathcal{F}$** a un point en commun.

Un programme linéaire est ϵ -loin d'avoir valeur $\leq v$ si il faut supprimer une fraction $\geq \epsilon$ de ses contraintes pour que le programme restant ait valeur $\leq v$.

Proposition. Si le PL est ϵ -loin d'avoir valeur $\leq v$, la **probabilité d'erreur** est $\leq 1/3$ pour $k \geq \frac{-\log 3}{1 - \log(\epsilon^{d+1})}$.

Répéter k fois :

Choisir $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ uniformément au hasard.

Si $\text{val}(\mathcal{R}) > v$ répondre NON.

Répondre OUI. ← Probabilité d'erreur ?

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si **une fraction α des $X \in \binom{\mathcal{F}}{d+1}$** sont d'intersection non vide, alors **une fraction $1 - (1 - \alpha)^{\frac{1}{d+1}}$ de $\mathcal{F}$** a un point en commun.

Un programme linéaire est ϵ -loin d'avoir valeur $\leq v$ si il faut supprimer une fraction $\geq \epsilon$ de ses contraintes pour que le programme restant ait valeur $\leq v$.

Proposition. Si le PL est ϵ -loin d'avoir valeur $\leq v$, la **probabilité d'erreur** est $\leq 1/3$ pour $k \geq \frac{-\log 3}{1 - \log(\epsilon^{d+1})}$.

réponse OUI : correcte

réponse NON : correcte avec $\Pr \geq 2/3$.

« ϵ -testeur »

Répéter k fois :

Choisir $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ uniformément au hasard.

Si $\text{val}(\mathcal{R}) > v$ répondre NON.

Répondre OUI. ← Probabilité d'erreur ?

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si **une fraction α des $X \in \binom{\mathcal{F}}{d+1}$** sont d'intersection non vide, alors **une fraction $1 - (1 - \alpha)^{\frac{1}{d+1}}$ de $\mathcal{F}$** a un point en commun.

Un programme linéaire est ϵ -loin d'avoir valeur $\leq v$ si il faut supprimer une fraction $\geq \epsilon$ de ses contraintes pour que le programme restant ait valeur $\leq v$.

Proposition. Si le PL est ϵ -loin d'avoir valeur $\leq v$, la **probabilité d'erreur** est $\leq 1/3$ pour $k \geq \frac{-\log 3}{1 - \log(\epsilon^{d+1})}$.

réponse OUI : correcte

réponse NON : correcte avec $\Pr \geq 2/3$.

« ϵ -testeur »

$$h \stackrel{\text{def}}{=} \{x : c^T x > \text{val}(\mathcal{F})\}$$

Preuve

Répéter k fois :

Choisir $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ uniformément au hasard.

Si $\text{val}(\mathcal{R}) > v$ répondre NON.

Répondre OUI. ← Probabilité d'erreur ?

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si **une fraction α des $X \in \binom{\mathcal{F}}{d+1}$** sont d'intersection non vide, alors **une fraction $1 - (1 - \alpha)^{\frac{1}{d+1}}$ de $\mathcal{F}$** a un point en commun.

Un programme linéaire est ϵ -loin d'avoir valeur $\leq v$ si il faut supprimer une fraction $\geq \epsilon$ de ses contraintes pour que le programme restant ait valeur $\leq v$.

Proposition. Si le PL est ϵ -loin d'avoir valeur $\leq v$, la **probabilité d'erreur** est $\leq 1/3$ pour $k \geq \frac{-\log 3}{1 - \log(\epsilon^{d+1})}$.

réponse OUI : correcte

réponse NON : correcte avec $\Pr \geq 2/3$.

« ϵ -testeur »

$$h \stackrel{\text{def}}{=} \{x : c^T x > \text{val}(\mathcal{F})\}$$

ϵ -loin $\Rightarrow$ tout "gros" $X \subseteq \mathcal{F}$ vérifie $(\cap X) \cap h = \emptyset$.

$$X \text{ gros} \Leftrightarrow |X| > (1 - \epsilon)|\mathcal{F}|.$$

Preuve

Répéter k fois :

Choisir $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ uniformément au hasard.

Si $\text{val}(\mathcal{R}) > v$ répondre NON.

Répondre OUI. ← Probabilité d'erreur ?

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si **une fraction α des $X \in \binom{\mathcal{F}}{d+1}$** sont d'intersection non vide, alors **une fraction $1 - (1 - \alpha)^{\frac{1}{d+1}}$ de $\mathcal{F}$** a un point en commun.

Un programme linéaire est ϵ -loin d'avoir valeur $\leq v$ si il faut supprimer une fraction $\geq \epsilon$ de ses contraintes pour que le programme restant ait valeur $\leq v$.

Proposition. Si le PL est ϵ -loin d'avoir valeur $\leq v$, la **probabilité d'erreur** est $\leq 1/3$ pour $k \geq \frac{-\log 3}{1 - \log(\epsilon^{d+1})}$.

réponse OUI : correcte

réponse NON : correcte avec $\Pr \geq 2/3$.

« ϵ -testeur »

$$h \stackrel{\text{def}}{=} \{x : c^T x > \text{val}(\mathcal{F})\} \quad \mathcal{F}_h \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1 \cap h, D_2 \cap h, \dots, D_n \cap h\}$$

ϵ -loin $\Rightarrow$ tout "gros" $X \subseteq \mathcal{F}$ vérifie $(\cap X) \cap h = \emptyset$.

$$X \text{ gros} \Leftrightarrow |X| > (1 - \epsilon)|\mathcal{F}|.$$

Preuve

Répéter k fois :

Choisir $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ uniformément au hasard.

Si $\text{val}(\mathcal{R}) > v$ répondre NON.

Répondre OUI. ← Probabilité d'erreur ?

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si **une fraction α des $X \in \binom{\mathcal{F}}{d+1}$** sont d'intersection non vide, alors **une fraction $1 - (1 - \alpha)^{\frac{1}{d+1}}$ de $\mathcal{F}$** a un point en commun.

Un programme linéaire est ϵ -loin d'avoir valeur $\leq v$ si il faut supprimer une fraction $\geq \epsilon$ de ses contraintes pour que le programme restant ait valeur $\leq v$.

Proposition. Si le PL est ϵ -loin d'avoir valeur $\leq v$, la **probabilité d'erreur** est $\leq 1/3$ pour $k \geq \frac{-\log 3}{1 - \log(\epsilon^{d+1})}$.

réponse OUI : correcte

réponse NON : correcte avec $\Pr \geq 2/3$.

« ϵ -testeur »

$$h \stackrel{\text{def}}{=} \{x : c^T x > \text{val}(\mathcal{F})\} \quad \mathcal{F}_h \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1 \cap h, D_2 \cap h, \dots, D_n \cap h\}$$

ϵ -loin $\Rightarrow$ tout "gros" $X \subseteq \mathcal{F}$ vérifie $(\cap X) \cap h = \emptyset$.

$$X \text{ gros} \Leftrightarrow |X| > (1 - \epsilon)|\mathcal{F}|.$$

Preuve

Répéter k fois :

Choisir $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ uniformément au hasard.

Si $\text{val}(\mathcal{R}) > v$ répondre NON.

Répondre OUI. ← Probabilité d'erreur ?

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si **une fraction α des $X \in \binom{\mathcal{F}}{d+1}$** sont d'intersection non vide, alors **une fraction $1 - (1 - \alpha)^{\frac{1}{d+1}}$ de $\mathcal{F}$** a un point en commun.

Un programme linéaire est ϵ -loin d'avoir valeur $\leq v$ si il faut supprimer une fraction $\geq \epsilon$ de ses contraintes pour que le programme restant ait valeur $\leq v$.

Proposition. Si le PL est ϵ -loin d'avoir valeur $\leq v$, la **probabilité d'erreur** est $\leq 1/3$ pour $k \geq \frac{-\log 3}{1 - \log(\epsilon^{d+1})}$.

réponse OUI : correcte

réponse NON : correcte avec $\Pr \geq 2/3$.

« ϵ -testeur »

$$h \stackrel{\text{def}}{=} \{x : c^T x > \text{val}(\mathcal{F})\} \quad \mathcal{F}_h \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1 \cap h, D_2 \cap h, \dots, D_n \cap h\}$$

ϵ -loin $\Rightarrow$ tout "gros" $X \subseteq \mathcal{F}_h$ vérifie $\cap X = \emptyset$.

$$X \text{ gros} \Leftrightarrow |X| > (1 - \epsilon)|\mathcal{F}|.$$

Preuve

Répéter k fois :

Choisir $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ uniformément au hasard.

Si $\text{val}(\mathcal{R}) > v$ répondre NON.

Répondre OUI. ← Probabilité d'erreur ?

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si **une fraction α des $X \in \binom{\mathcal{F}}{d+1}$** sont d'intersection non vide, alors **une fraction $1 - (1 - \alpha)^{\frac{1}{d+1}}$ de $\mathcal{F}$** a un point en commun.

Un programme linéaire est ϵ -loin d'avoir valeur $\leq v$ si il faut supprimer une fraction $\geq \epsilon$ de ses contraintes pour que le programme restant ait valeur $\leq v$.

Proposition. Si le PL est ϵ -loin d'avoir valeur $\leq v$, la **probabilité d'erreur** est $\leq 1/3$ pour $k \geq \frac{-\log 3}{1 - \log(\epsilon^{d+1})}$.

réponse OUI : correcte

réponse NON : correcte avec $\Pr \geq 2/3$.

« ϵ -testeur »

$$h \stackrel{\text{def}}{=} \{x : c^T x > \text{val}(\mathcal{F})\} \quad \mathcal{F}_h \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1 \cap h, D_2 \cap h, \dots, D_n \cap h\}$$

ϵ -loin $\Rightarrow$ tout "gros" $X \subseteq \mathcal{F}_h$ vérifie $\cap X = \emptyset$.

$$X \text{ gros} \Leftrightarrow |X| > (1 - \epsilon)|\mathcal{F}|.$$

$\Rightarrow$ la fraction α des $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ tels que $\cap \mathcal{R} \neq \emptyset$ est majorée.

$$\alpha \leq 1 - \epsilon^{d+1}$$

On ajuste k pour que $\alpha^k \leq 1/3$.

Preuve

Répéter k fois :

Choisir $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ uniformément au hasard.

Si $\text{val}(\mathcal{R}) > v$ répondre NON.

Répondre OUI. ← Probabilité d'erreur ?

Helly fractionnaire. $\forall \alpha > 0$ et $d \geq 1$, pour toute famille finie $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^d$, si **une fraction α des $X \in \binom{\mathcal{F}}{d+1}$** sont d'intersection non vide, alors **une fraction $1 - (1 - \alpha)^{\frac{1}{d+1}}$ de $\mathcal{F}$** a un point en commun.

Un programme linéaire est ϵ -loin d'avoir valeur $\leq v$ si il faut supprimer une fraction $\geq \epsilon$ de ses contraintes pour que le programme restant ait valeur $\leq v$.

Proposition. Si le PL est ϵ -loin d'avoir valeur $\leq v$, la **probabilité d'erreur** est $\leq 1/3$ pour $k \geq \frac{-\log 3}{1 - \log(\epsilon^{d+1})}$.

réponse OUI : correcte

réponse NON : correcte avec $\Pr \geq 2/3$.

« ϵ -testeur »

$$h \stackrel{\text{def}}{=} \{x : c^T x > \text{val}(\mathcal{F})\} \quad \mathcal{F}_h \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1 \cap h, D_2 \cap h, \dots, D_n \cap h\}$$

ϵ -loin $\Rightarrow$ tout "gros" $X \subseteq \mathcal{F}_h$ vérifie $\cap X = \emptyset$.

$$X \text{ gros} \Leftrightarrow |X| > (1 - \epsilon)|\mathcal{F}|.$$

$\Rightarrow$ la fraction α des $\mathcal{R} \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ tels que $\cap \mathcal{R} \neq \emptyset$ est majorée.

$$\alpha \leq 1 - \epsilon^{d+1}$$

On ajuste k pour que $\alpha^k \leq 1/3$. $\square$

Preuve

2nd algorithm

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

Associons à $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ l'ensemble $V(\mathcal{R})$ des contraintes
violées par $\text{argmin}_{x \in \mathcal{R}} c^T x$.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \mapsto \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

Associons à $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ l'ensemble $V(\mathcal{R})$ des contraintes
violées par $\text{argmin}_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$.

$$\mathcal{R} = \{ \text{blue rectangle}, \text{red rectangle} \}$$

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \mapsto \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

Associons à $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ l'ensemble $V(\mathcal{R})$ des contraintes
violées par $\text{argmin}_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$.

$$\mathcal{R} = \{ \text{blue rectangle}, \text{red rectangle} \}$$

$$V(\mathcal{R}) = \{ \text{yellow rectangle}, \text{orange rectangle} \}$$

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \mapsto \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

Associons à $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ l'ensemble $V(\mathcal{R})$ des contraintes
violées par $\text{argmin}_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$.

$$\mathcal{R} = \{ \text{blue diamond}, \text{red rectangle} \} \quad V(\mathcal{R}) = \{ \text{yellow trapezoid}, \text{orange rectangle} \}$$

$$V(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \{h \in \mathcal{F} \setminus \mathcal{R} : \text{val}(\mathcal{R} \cup \{h\}) \neq \text{val}(\mathcal{R})\}.$$

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$ $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \mapsto \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$ On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

Associons à $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ l'ensemble $V(\mathcal{R})$ des contraintes
violées par $\text{argmin}_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$.

$$\mathcal{R} = \{ \text{blue diamond}, \text{red rectangle} \} \quad V(\mathcal{R}) = \{ \text{yellow rectangle}, \text{orange rectangle} \}$$

$$V(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \{h \in \mathcal{F} \setminus \mathcal{R} : \text{val}(\mathcal{R} \cup \{h\}) \neq \text{val}(\mathcal{R})\}.$$

$$\text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{F}) \quad \Leftrightarrow \quad V(\mathcal{R}) = \emptyset.$$

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \mapsto \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

Associons à $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ l'ensemble $V(\mathcal{R})$ des contraintes
violées par $\text{argmin}_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$.

$$\mathcal{R} = \{ \text{blue diamond}, \text{red rectangle} \} \quad V(\mathcal{R}) = \{ \text{yellow rectangle}, \text{orange rectangle} \}$$

$$V(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \{h \in \mathcal{F} \setminus \mathcal{R} : \text{val}(\mathcal{R} \cup \{h\}) \neq \text{val}(\mathcal{R})\}.$$

$$\text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{F}) \Leftrightarrow V(\mathcal{R}) = \emptyset.$$

0. Associer à chaque $D_i \in \mathcal{F}$ un poids $w_i \stackrel{\text{def}}{=} 1$.
1. Choisir $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ aléatoire de taille r selon les poids $w_\bullet$.
2. Si $V(\mathcal{R}) = \emptyset$ terminer en retournant $\mathcal{R}$.
3. Si $w(V(\mathcal{R})) > \alpha w(\mathcal{F})$ retourner en 1.
4. Doubler w_i pour chaque $D_i \in V(\mathcal{R})$ et retourner en 1.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \mapsto \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

Associons à $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ l'ensemble $V(\mathcal{R})$ des contraintes
violées par $\text{argmin}_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$.

$$\mathcal{R} = \{ \text{blue diamond}, \text{red rectangle} \} \quad V(\mathcal{R}) = \{ \text{yellow trapezoid}, \text{orange rectangle} \}$$

$$V(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \{h \in \mathcal{F} \setminus \mathcal{R} : \text{val}(\mathcal{R} \cup \{h\}) \neq \text{val}(\mathcal{R})\}.$$

$$\text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{F}) \Leftrightarrow V(\mathcal{R}) = \emptyset.$$

0. Associer à chaque $D_i \in \mathcal{F}$ un poids $w_i \stackrel{\text{def}}{=} 1$.
1. Choisir $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ aléatoire de taille r selon les poids $w_\bullet$.
2. Si $V(\mathcal{R}) = \emptyset$ terminer en retournant $\mathcal{R}$.
3. Si $w(V(\mathcal{R})) > \alpha w(\mathcal{F})$ retourner en 1.
4. Doubler w_i pour chaque $D_i \in V(\mathcal{R})$ et retourner en 1.

$$r \stackrel{\text{def}}{=} 4d^2$$

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \mapsto \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

Associons à $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ l'ensemble $V(\mathcal{R})$ des contraintes
violées par $\text{argmin}_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$.

$$\mathcal{R} = \{ \text{blue diamond}, \text{red rectangle} \} \quad V(\mathcal{R}) = \{ \text{yellow trapezoid}, \text{orange rectangle} \}$$

$$V(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \{h \in \mathcal{F} \setminus \mathcal{R} : \text{val}(\mathcal{R} \cup \{h\}) \neq \text{val}(\mathcal{R})\}.$$

$$\text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{F}) \Leftrightarrow V(\mathcal{R}) = \emptyset.$$

0. Associer à chaque $D_i \in \mathcal{F}$ un poids $w_i \stackrel{\text{def}}{=} 1$.

1. Choisir $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ aléatoire de taille r selon les poids $w_\bullet$.

2. Si $V(\mathcal{R}) = \emptyset$ terminer en retournant $\mathcal{R}$.

3. Si $w(V(\mathcal{R})) > \alpha w(\mathcal{F})$ retourner en 1.

4. Doubler w_i pour chaque $D_i \in V(\mathcal{R})$ et retourner en 1.

$$r \stackrel{\text{def}}{=} 4d^2$$

$$\alpha \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{2d}$$

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \mapsto \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

Associons à $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ l'ensemble $V(\mathcal{R})$ des contraintes
violées par $\text{argmin}_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$.

$$\mathcal{R} = \{ \text{blue diamond}, \text{red rectangle} \} \quad V(\mathcal{R}) = \{ \text{yellow trapezoid}, \text{orange rectangle} \}$$

$$V(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \{h \in \mathcal{F} \setminus \mathcal{R} : \text{val}(\mathcal{R} \cup \{h\}) \neq \text{val}(\mathcal{R})\}.$$

$$\text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{F}) \Leftrightarrow V(\mathcal{R}) = \emptyset.$$

0. Associer à chaque $D_i \in \mathcal{F}$ un poids $w_i \stackrel{\text{def}}{=} 1$.

1. Choisir $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ aléatoire de taille r selon les poids $w_\bullet$.

2. Si $V(\mathcal{R}) = \emptyset$ terminer en retournant $\mathcal{R}$.

3. Si $w(V(\mathcal{R})) > \alpha w(\mathcal{F})$ retourner en 1.

4. Doubler w_i pour chaque $D_i \in V(\mathcal{R})$ et retourner en 1.

$$r \stackrel{\text{def}}{=} 4d^2$$

$$\alpha \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{2d}$$

Correct si il termine.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ des demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \mapsto \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

Associons à $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ l'ensemble $V(\mathcal{R})$ des contraintes
violées par $\text{argmin}_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$.

$$\mathcal{R} = \{ \text{blue diamond}, \text{red rectangle} \} \quad V(\mathcal{R}) = \{ \text{yellow trapezoid}, \text{orange rectangle} \}$$

$$V(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \{h \in \mathcal{F} \setminus \mathcal{R} : \text{val}(\mathcal{R} \cup \{h\}) \neq \text{val}(\mathcal{R})\}.$$

$$\text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{F}) \Leftrightarrow V(\mathcal{R}) = \emptyset.$$

0. Associer à chaque $D_i \in \mathcal{F}$ un poids $w_i \stackrel{\text{def}}{=} 1$.

1. Choisir $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ aléatoire de taille r selon les poids $w_\bullet$.

2. Si $V(\mathcal{R}) = \emptyset$ terminer en retournant $\mathcal{R}$.

3. Si $w(V(\mathcal{R})) > \alpha w(\mathcal{F})$ retourner en 1.

4. Doubler w_i pour chaque $D_i \in V(\mathcal{R})$ et retourner en 1.

$$r \stackrel{\text{def}}{=} 4d^2$$

$$\alpha \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{2d}$$

Correct si il termine.

Il termine très probablement
en $4d \log n$ rounds.

0. Associer à chaque $D_i \in \mathcal{F}$ un poids $w_i \stackrel{\text{def}}{=} 1$.
1. Choisir $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ aléatoire de taille r selon les poids $w_\bullet$.
2. Si $V(\mathcal{R}) = \emptyset$ terminer en retournant $\mathcal{R}$.
3. Si $w(V(\mathcal{R})) > \alpha w(\mathcal{F})$ retourner en 1.
4. Doubler w_i pour chaque $D_i \in V(\mathcal{R})$ et retourner en 1.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

$$V(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \{h \in \mathcal{F} \setminus \mathcal{R} : \text{val}(\mathcal{R} \cup \{h\}) \neq \text{val}(\mathcal{R})\}.$$

0. Associer à chaque $D_i \in \mathcal{F}$ un poids $w_i \stackrel{\text{def}}{=} 1$.
1. Choisir $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ aléatoire de taille r selon les poids $w_\bullet$.
2. Si $V(\mathcal{R}) = \emptyset$ terminer en retournant $\mathcal{R}$.
3. Si $w(V(\mathcal{R})) > \alpha w(\mathcal{F})$ retourner en 1.
4. Doubler w_i pour chaque $D_i \in V(\mathcal{R})$ et retourner en 1.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

$$V(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \{h \in \mathcal{F} \setminus \mathcal{R} : \text{val}(\mathcal{R} \cup \{h\}) \neq \text{val}(\mathcal{R})\}.$$

Rappel. Il existe $\mathcal{R}_0 \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ tel que $\text{val}(\mathcal{R}_0) = \text{val}(\mathcal{F})$.

0. Associer à chaque $D_i \in \mathcal{F}$ un poids $w_i \stackrel{\text{def}}{=} 1$.
1. Choisir $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ aléatoire de taille r selon les poids $w_\bullet$.
2. Si $V(\mathcal{R}) = \emptyset$ terminer en retournant $\mathcal{R}$.
3. Si $w(V(\mathcal{R})) > \alpha w(\mathcal{F})$ retourner en 1.
4. Doubler w_i pour chaque $D_i \in V(\mathcal{R})$ et retourner en 1.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

$$V(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \{h \in \mathcal{F} \setminus \mathcal{R} : \text{val}(\mathcal{R} \cup \{h\}) \neq \text{val}(\mathcal{R})\}.$$

Rappel. Il existe $\mathcal{R}_0 \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ tel que $\text{val}(\mathcal{R}_0) = \text{val}(\mathcal{F})$.

$$\text{val}(\mathcal{F}) \geq \text{val}(\mathcal{R})$$

0. Associer à chaque $D_i \in \mathcal{F}$ un poids $w_i \stackrel{\text{def}}{=} 1$.
1. Choisir $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ aléatoire de taille r selon les poids $w_\bullet$.
2. Si $V(\mathcal{R}) = \emptyset$ terminer en retournant $\mathcal{R}$.
3. Si $w(V(\mathcal{R})) > \alpha w(\mathcal{F})$ retourner en 1.
4. Doubler w_i pour chaque $D_i \in V(\mathcal{R})$ et retourner en 1.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

$$V(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \{h \in \mathcal{F} \setminus \mathcal{R} : \text{val}(\mathcal{R} \cup \{h\}) \neq \text{val}(\mathcal{R})\}.$$

Rappel. Il existe $\mathcal{R}_0 \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ tel que $\text{val}(\mathcal{R}_0) = \text{val}(\mathcal{F})$.

$$V(\mathcal{R}) \cap \mathcal{R}_0 = \emptyset \quad \Rightarrow \quad \text{val}(\mathcal{F}) \geq \text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{R} \cup \mathcal{R}_0)$$

0. Associer à chaque $D_i \in \mathcal{F}$ un poids $w_i \stackrel{\text{def}}{=} 1$.
1. Choisir $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ aléatoire de taille r selon les poids $w_\bullet$.
2. Si $V(\mathcal{R}) = \emptyset$ terminer en retournant $\mathcal{R}$.
3. Si $w(V(\mathcal{R})) > \alpha w(\mathcal{F})$ retourner en 1.
4. Doubler w_i pour chaque $D_i \in V(\mathcal{R})$ et retourner en 1.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

$$V(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \{h \in \mathcal{F} \setminus \mathcal{R} : \text{val}(\mathcal{R} \cup \{h\}) \neq \text{val}(\mathcal{R})\}.$$

Rappel. Il existe $\mathcal{R}_0 \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ tel que $\text{val}(\mathcal{R}_0) = \text{val}(\mathcal{F})$.

$$V(\mathcal{R}) \cap \mathcal{R}_0 = \emptyset \quad \Rightarrow \quad \text{val}(\mathcal{F}) \geq \text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{R} \cup \mathcal{R}_0) \geq \text{val}(\mathcal{R}_0)$$

0. Associer à chaque $D_i \in \mathcal{F}$ un poids $w_i \stackrel{\text{def}}{=} 1$.
1. Choisir $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ aléatoire de taille r selon les poids $w_\bullet$.
2. Si $V(\mathcal{R}) = \emptyset$ terminer en retournant $\mathcal{R}$.
3. Si $w(V(\mathcal{R})) > \alpha w(\mathcal{F})$ retourner en 1.
4. Doubler w_i pour chaque $D_i \in V(\mathcal{R})$ et retourner en 1.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

$$V(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \{h \in \mathcal{F} \setminus \mathcal{R} : \text{val}(\mathcal{R} \cup \{h\}) \neq \text{val}(\mathcal{R})\}.$$

Rappel. Il existe $\mathcal{R}_0 \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ tel que $\text{val}(\mathcal{R}_0) = \text{val}(\mathcal{F})$.

$$V(\mathcal{R}) \cap \mathcal{R}_0 = \emptyset \quad \Rightarrow \quad \text{val}(\mathcal{F}) \geq \text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{R} \cup \mathcal{R}_0) \geq \text{val}(\mathcal{R}_0) \quad \Rightarrow \quad V(\mathcal{R}) = \emptyset.$$

Tout ensemble de contraintes dont le poids double contient une contrainte de $\mathcal{R}_0$.

0. Associer à chaque $D_i \in \mathcal{F}$ un poids $w_i \stackrel{\text{def}}{=} 1$.
1. Choisir $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ aléatoire de taille r selon les poids $w_\bullet$.
2. Si $V(\mathcal{R}) = \emptyset$ terminer en retournant $\mathcal{R}$.
3. Si $w(V(\mathcal{R})) > \alpha w(\mathcal{F})$ retourner en 1.
4. Doubler w_i pour chaque $D_i \in V(\mathcal{R})$ et retourner en 1.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

$$V(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \{h \in \mathcal{F} \setminus \mathcal{R} : \text{val}(\mathcal{R} \cup \{h\}) \neq \text{val}(\mathcal{R})\}.$$

Rappel. Il existe $\mathcal{R}_0 \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ tel que $\text{val}(\mathcal{R}_0) = \text{val}(\mathcal{F})$.

$$V(\mathcal{R}) \cap \mathcal{R}_0 = \emptyset \quad \Rightarrow \quad \text{val}(\mathcal{F}) \geq \text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{R} \cup \mathcal{R}_0) \geq \text{val}(\mathcal{R}_0) \quad \Rightarrow \quad V(\mathcal{R}) = \emptyset.$$

Tout ensemble de contraintes dont le poids double contient une contrainte de $\mathcal{R}_0$.

Après k repondérations. : $w(\mathcal{F}) \leq n(1 + \alpha)^k$

0. Associer à chaque $D_i \in \mathcal{F}$ un poids $w_i \stackrel{\text{def}}{=} 1$.
1. Choisir $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ aléatoire de taille r selon les poids $w_\bullet$.
2. Si $V(\mathcal{R}) = \emptyset$ terminer en retournant $\mathcal{R}$.
3. Si $w(V(\mathcal{R})) > \alpha w(\mathcal{F})$ retourner en 1.
4. Doubler w_i pour chaque $D_i \in V(\mathcal{R})$ et retourner en 1.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \mapsto \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

$$V(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \{h \in \mathcal{F} \setminus \mathcal{R} : \text{val}(\mathcal{R} \cup \{h\}) \neq \text{val}(\mathcal{R})\}.$$

Rappel. Il existe $\mathcal{R}_0 \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ tel que $\text{val}(\mathcal{R}_0) = \text{val}(\mathcal{F})$.

$$V(\mathcal{R}) \cap \mathcal{R}_0 = \emptyset \Rightarrow \text{val}(\mathcal{F}) \geq \text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{R} \cup \mathcal{R}_0) \geq \text{val}(\mathcal{R}_0) \Rightarrow V(\mathcal{R}) = \emptyset.$$

Tout ensemble de contraintes dont le poids double contient une contrainte de $\mathcal{R}_0$.

Après k repondérations. : $w(\mathcal{F}) \leq n(1 + \alpha)^k$ et $w(\mathcal{R}_0) \gtrsim d2^{\frac{k}{d}}$.

0. Associer à chaque $D_i \in \mathcal{F}$ un poids $w_i \stackrel{\text{def}}{=} 1$.
1. Choisir $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ aléatoire de taille r selon les poids $w_\bullet$.
2. Si $V(\mathcal{R}) = \emptyset$ terminer en retournant $\mathcal{R}$.
3. Si $w(V(\mathcal{R})) > \alpha w(\mathcal{F})$ retourner en 1.
4. Doubler w_i pour chaque $D_i \in V(\mathcal{R})$ et retourner en 1.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

$$V(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \{h \in \mathcal{F} \setminus \mathcal{R} : \text{val}(\mathcal{R} \cup \{h\}) \neq \text{val}(\mathcal{R})\}.$$

Rappel. Il existe $\mathcal{R}_0 \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ tel que $\text{val}(\mathcal{R}_0) = \text{val}(\mathcal{F})$.

$$V(\mathcal{R}) \cap \mathcal{R}_0 = \emptyset \quad \Rightarrow \quad \text{val}(\mathcal{F}) \geq \text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{R} \cup \mathcal{R}_0) \geq \text{val}(\mathcal{R}_0) \quad \Rightarrow \quad V(\mathcal{R}) = \emptyset.$$

Tout ensemble de contraintes dont le poids double contient une contrainte de $\mathcal{R}_0$.

Après k repondérations. :

$$w(\mathcal{F}) \leq n(1 + \alpha)^k \quad \text{et} \quad w(\mathcal{R}_0) \gtrsim d2^{\frac{k}{d}}.$$

Pour $\alpha \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{2^d}$ on a $1 + \alpha < 2^{\frac{1}{d}}$ $\Rightarrow$ le nombre de passages par 4. possibles est borné.

0. Associer à chaque $D_i \in \mathcal{F}$ un poids $w_i \stackrel{\text{def}}{=} 1$.
1. Choisir $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ aléatoire de taille r selon les poids $w_\bullet$.
2. Si $V(\mathcal{R}) = \emptyset$ terminer en retournant $\mathcal{R}$.
3. Si $w(V(\mathcal{R})) > \alpha w(\mathcal{F})$ retourner en 1.
4. Doubler w_i pour chaque $D_i \in V(\mathcal{R})$ et retourner en 1.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \quad \mapsto \quad \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

$$V(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \{h \in \mathcal{F} \setminus \mathcal{R} : \text{val}(\mathcal{R} \cup \{h\}) \neq \text{val}(\mathcal{R})\}.$$

Rappel. Il existe $\mathcal{R}_0 \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ tel que $\text{val}(\mathcal{R}_0) = \text{val}(\mathcal{F})$.

$$V(\mathcal{R}) \cap \mathcal{R}_0 = \emptyset \quad \Rightarrow \quad \text{val}(\mathcal{F}) \geq \text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{R} \cup \mathcal{R}_0) \geq \text{val}(\mathcal{R}_0) \quad \Rightarrow \quad V(\mathcal{R}) = \emptyset.$$

Tout ensemble de contraintes dont le poids double contient une contrainte de $\mathcal{R}_0$.

Après k repondérations. :

$$w(\mathcal{F}) \leq n(1 + \alpha)^k \quad \text{et} \quad w(\mathcal{R}_0) \gtrsim d2^{\frac{k}{d}}.$$

Pour $\alpha \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{2d}$ on a $1 + \alpha < 2^{\frac{1}{d}}$ $\Rightarrow$ le nombre de passages par 4. possibles est borné.

Pour $r \stackrel{\text{def}}{=} 4d^2$ on a $\mathbb{P}[w(V(\mathcal{R})) > \alpha w(\mathcal{F})] \leq \frac{1}{2}$.

0. Associer à chaque $D_i \in \mathcal{F}$ un poids $w_i \stackrel{\text{def}}{=} 1$.
1. Choisir $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ aléatoire de taille r selon les poids $w_\bullet$.
2. Si $V(\mathcal{R}) = \emptyset$ terminer en retournant $\mathcal{R}$.
3. Si $w(V(\mathcal{R})) > \alpha w(\mathcal{F})$ retourner en 1.
4. Doubler w_i pour chaque $D_i \in V(\mathcal{R})$ et retourner en 1.

$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ demi-espaces de $\mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F} \mapsto \text{val}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{x \in \cap \mathcal{R}} c^T x$$

On cherche $\text{val}(\mathcal{F})$.

$$V(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \{h \in \mathcal{F} \setminus \mathcal{R} : \text{val}(\mathcal{R} \cup \{h\}) \neq \text{val}(\mathcal{R})\}.$$

Rappel. Il existe $\mathcal{R}_0 \in \binom{\mathcal{F}}{d}$ tel que $\text{val}(\mathcal{R}_0) = \text{val}(\mathcal{F})$.

$$V(\mathcal{R}) \cap \mathcal{R}_0 = \emptyset \Rightarrow \text{val}(\mathcal{F}) \geq \text{val}(\mathcal{R}) = \text{val}(\mathcal{R} \cup \mathcal{R}_0) \geq \text{val}(\mathcal{R}_0) \Rightarrow V(\mathcal{R}) = \emptyset.$$

Tout ensemble de contraintes dont le poids double contient une contrainte de $\mathcal{R}_0$.

Après k repondérations. :

$$w(\mathcal{F}) \leq n(1 + \alpha)^k \quad \text{et} \quad w(\mathcal{R}_0) \gtrsim d2^{\frac{k}{d}}.$$

Pour $\alpha \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{2d}$ on a $1 + \alpha < 2^{\frac{1}{d}}$ $\Rightarrow$ le nombre de passages par 4. possibles est borné.

Pour $r \stackrel{\text{def}}{=} 4d^2$ on a $\mathbb{P}[w(V(\mathcal{R})) > \alpha w(\mathcal{F})] \leq \frac{1}{2}$.

← jolie analyse en moyenne de $V(\mathcal{R})$ via **Helly**.

□

7. Et ensuite ?

Commencé par de la [convexité combinatoire](#).

Commencé par de la [convexité combinatoire](#).

Notions de base, **Carathéodory**, **Radon**, **Helly**.

Commencé par de la **convexité combinatoire**.

Notions de base, **Carathéodory**, **Radon**, **Helly**.

Point central, **Carathéodory coloré**, **sélection**.

Commencé par de la **convexité combinatoire**.

Notions de base, **Carathéodory**, **Radon**, **Helly**.

Point central, **Carathéodory coloré**, **sélection**.

Helly fractionnaire, preuve du cas faible.

Commencé par de la **convexité combinatoire**.

Notions de base, **Carathéodory**, **Radon**, **Helly**.

Point central, **Carathéodory coloré**, **sélection**.

Helly fractionnaire, preuve du cas faible.

Test de propriété et **repondération itérée** en PL.

Commencé par de la **convexité combinatoire**.

Notions de base, **Carathéodory**, **Radon**, **Helly**.

Point central, **Carathéodory coloré**, **sélection**.

Helly fractionnaire, preuve du cas faible.

Test de propriété et **repondération itérée** en PL.

Puis aller vers des **structures mathématiques** voisines.

Complexes simpliciaux géométriques, cadre topologique.

Complexes simpliciaux abstraits, f -vecteurs.

Friabilité, borne supérieure, **Helly fractionnaire fort**.

Commencé par de la **convexité combinatoire**.

Notions de base, **Carathéodory**, **Radon**, **Helly**.

Point central, **Carathéodory coloré**, **sélection**.

Helly fractionnaire, preuve du cas faible.

Test de propriété et **repondération itérée** en PL.

Puis aller vers des **structures mathématiques** voisines.

Complexes simpliciaux géométriques, cadre topologique.

Complexes simpliciaux abstraits, f -vecteurs.

Friabilité, borne supérieure, **Helly fractionnaire fort**. $1 - (1 - \alpha)^{\frac{1}{d+1}}$

Commencé par de la **convexité combinatoire**.

Notions de base, **Carathéodory**, **Radon**, **Helly**.

Point central, **Carathéodory coloré**, sélection.

Helly fractionnaire, preuve du cas faible.

Test de propriété et **repondération itérée** en PL.

Puis aller vers des **structures mathématiques** voisines.

Complexes simpliciaux géométriques, cadre topologique.

Complexes simpliciaux abstraits, f -vecteurs.

Friabilité, borne supérieure, **Helly fractionnaire fort**. $1 - (1 - \alpha)^{\frac{1}{d+1}}$

RDV : 18 juin à 9h !